

VR/Ø/EGE VOORDEELWEKEN

5% EXTRA
VROEGE
VOORDEEL-
KORTING

Dit jaar gaan we nóg
vroeger van start
met extra voordeel
op Bravecto®!

Vanaf 15 januari t/m 23 februari 2024
profiteert u maar liefst van 5% extra
Vroege Voordeeltorting bij aankoop van 10
dezelfde Bravecto® (kauwtablet/spot-on)
of Bravecto® Plus (duo)verpakkingen.



VLOOIEN EN TEKEN KUNNEN HET HELE JAAR DOOR VOORKOMEN: ADVISEER UW KLANTEN LANGDURIGE BESCHERMING.

Teken blijven vanaf 7°C actief en vlooien zorgen het hele jaar voor overlast, mede omdat zij hun cyclus binnenshuis kunnen voltooien. Denk dus het hele jaar rond aan het beschermen van honden en katten tegen parasieten! Adviseer uw klanten dan ook langdurige bescherming tegen vlooien en teken en verkoop antiparasitica in één keer voor het komende jaar.

Hoeveel 5% extra Vroege Voordeelkorting scheelt, wordt hieronder duidelijk.



KORTINGSVOORBEELD 1 BIJ AANKOOP VANAF 10 STUKS* BRAVECTO® PLUS SPOT-ON GROTE KAT

Listprijs 2023 Bravecto® Plus spot-on grote kat - € 28,60 per stuk
Actieprijs bij bestellen vóór 1 februari 2024* - € 27,20 per stuk
Listprijs 2024 Bravecto® Plus spot-on grote kat - € 29,60 per stuk
Actieprijs bij bestellen op of ná 1 februari 2024* - € 28,15 per stuk



Totale besparing

tot
€ 14,50
EXTRA KORTING!*



KORTINGSVOORBEELD 2 BIJ AANKOOP VANAF 10 STUKS* BRAVECTO® KAUWTABLET GROTE HOND

Listprijs 2023 Bravecto® kauwtablet grote hond - € 26,25 per stuk
Actieprijs bij bestellen vóór 1 februari 2024* - € 24,90 per stuk
Listprijs 2024 Bravecto® kauwtablet grote hond - € 27,15 per stuk
Actieprijs bij bestellen op of ná 1 februari 2024* - € 25,75 per stuk



Totale besparing

tot
€ 14,00
EXTRA KORTING!*



MSD
ANIMAL HEALTH
UW PARTNER
IN PREVENTIE



DIRECT BESTELLEN?

Ga naar <https://shop.msd-animal-health.nl/> of bestel via uw groothandel.

Vanaf 1 februari 2024 geldt er een prijsverhoging voor Bravecto®. Scan de QR-code hiernaast om de volledige voorwaarden van de Bravecto® Vroege Voordeelweken na te lezen.

Bravecto Plus spot-on oplossing voor katten, per pipet: 500/25, 250/12,5 of 112,5/6,25 mg fluralaner/moxidectine. Doel-dier: Kat. Indicaties: Voor katten met, of met een risico op, gecombineerde parasitaire infestaties met teken of vlooien en oormijten, maagdarmparasieten, hartwormen of longwormen. Het diergeenmiddel is alleen geïndiceerd wanneer gebruik tegen teken of vlooien en één of meerdere van de andere doelparasieten tegelijkertijd is geïndiceerd. Voor de behandeling van teken- en vlooiënfestaties bij katten met onmiddellijke en aanhoudende vlooiën (*Ctenocephalides felis*) en teken (*Ixodes ricinus*) dodende werking gedurende 12 weken. Vlooien en teken moeten gehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om het werkzame bestanddeel te worden aan het werkzame bestanddeel. Het diergeenmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis (VAD). Voor de behandeling van infestaties met oormijten (*Otodectes cynotis*). Voor de behandeling van infestaties met intestinale rondwormen (4^e stadium larven, immature en volwassen vormen van *Toxocara cati*) en haakwormen (4^e stadium larven, immature en volwassen vormen van *Ancylostoma tubaeforme*). Indien herhaald toegediend met een interval van 12 weken zorgt het diergeenmiddel voor onderbroken preventie van hartwormziekte veroorzaakt door *Dirofilaria immitis*. Preventie van selurostrongylose (door het voorkomen van de ontwikkeling van volwassen *Aelurostrongylus abstrusus*, verantwoordelijk voor klinische ziekte). Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of hulpstoffen. Bijwerkingen: Milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek (kaalheid, huidschilfers, roodheid en jeuk) zijn vaak (1 tot 10 dieren/100 behandelde dieren) waargenomen. Kortademigheid na het likken van de toedieningsplek, versnelde ademhaling, kwijlen, braken, braken met bloed, diarree, sloomheid, koorts, en verwijding van de pupillen zijn soms (1 tot 10 dieren/1.000 behandelde dieren) waargenomen. Anorexie evenals neurologische verschijnselen zoals tremoren en ataxie zijn zeer zelden (<1/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen) waargenomen. Toediening en dosering: Voor spot-on gebruik, draag handschoenen tijdens toediening. Pipet(ten) in overeenstemming met diergewicht. Waarschuwingen: Het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan niet worden uitgesloten, omdat teken en vlooien begonnen moeten zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner. Voorkom contact met de ogen van het dier. Niet direct op huidlaesies gebruiken. Niet gebruiken bij kittens jonger dan 9 weken en/of katten lichter dan 1,2 kg. Niet oraal toedienen. Voorkom dat pas behandelde dieren elkaar schoonlikken. Contact met het diergeenmiddel dient vermeden te worden en beschermende wegwerphandschoenen, verkregen bij dit diergeenmiddel, moeten worden gedragen bij toediening van het diergeenmiddel. Overgevoelighedsreacties bij mensen zijn mogelijk. Personen met een overgevoeligheid voor fluralaner of één van de hulpstoffen dienen elke blootstelling aan het diergeenmiddel te vermijden. Het diergeenmiddel is zeer brandbaar. Houd het weg van warmte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. EU/2/18/224/001-006, REG NL 120324-120326 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 31 maart 2023

Bravecto spot-on oplossing voor honden & katten, kauwtablet voor honden, per pipet/tablet: 1400, 1000, 500, 250 of 112,5 mg fluralaner. Doel-dier: Hond/Kat. Indicaties: Behandeling van teken- en vlooiëninfestaties (ook bij vlooiënallergiedermatitis) met een dodende werking gedurende 12 weken; behandeling van demodicose (hond) en schurft (hond) en oormijt (kat) infestaties; Alleen kauwtablet: Vermindering van het risico op infectie met *Babesia canis canis* / *Dipylidium caninum* gedurende 12 weken als gevolg van werkzaamheid tegen de *Dermacentor reticulatus* / *Ctenocephalides felis* vector. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Spot-on kat: Vaak (1 tot 10 dieren/100 behandelde dieren): milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek zoals roodheid en jeuk en kaalheid. Soms (1 tot 10 dieren/1.000 behandelde dieren): spiertremor, sloomheid, anorexie, braken en kwijlen. Zeer zelden (<1/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen): convulsie. Spot-on hond: Vaak (1 tot 10 dieren/100 behandelde dieren): milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek zoals roodheid en kaalheid. Zeer zelden (<1/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen): sloomheid, anorexie, braken, spiertremor, ataxie en convulsie. Kauwtablet hond: Vaak (1 tot 10 dieren/100 behandelde dieren): milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals anorexie, kwijlen, diarree en braken. Zeer zelden (<1/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen): sloomheid, spiertremor, ataxie en convulsie. Toediening en dosering: Voor spot-on/oraal gebruik. Pipet(ten)/kauwtablet(ten) in overeenstemming met diergewicht. Waarschuwingen: Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner, het risico op overdracht van parasiet gebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten. Onnodig gebruik van antiparasitica of gebruik anders dan aangegeven in de SPC kan de selectiedruk op resistentie verhogen en leiden tot verminderde werkzaamheid. De beslissing om het diergeenmiddel te gebruiken dient voor elk individueel dier gebaseerd te zijn op bevestiging van de parasitaire soort en mate van infestatie, of het risico op infestatie gebaseerd op epidemiologische eigenschappen. De mogelijkheid dat andere dieren in hetzelfde huishouden een bron van herinfectie met parasieten kunnen zijn moet in overweging worden genomen, en indien nodig moeten deze behandeld worden met een geschikt diergeenmiddel. Overgevoelighedsreacties bij mensen zijn waargenomen; Honden: kan gebruikt worden bij fokdieren, dracht en lactatie; Katten: bij gebruik tijdens dracht/lactatie is de veiligheid niet bewezen; Spot-on & kauwtablet: Niet gebruiken bij kittens <9 weken / pups <8 weken en/of katten <1,2 kg / honden <2 kg. Niet toedienen met een interval <8 weken. Kauwtablet: Gebruik met voorzichtigheid bij honden met een historie van epilepsie; Spot-on: Niet oraal toedienen. Voorkom dat pas behandelde dieren elkaar verzorgen. Draag handschoenen bij toediening en voorkom contact met de toedieningsplek gedurende 48 uur. EU/2/13/158/001-031, REG NL 113015-113019, 116438-116445, UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 16 mei 2023.

*Bij aankoop vanaf 10 stuks Bravecto® (kauwtablet/spot-on) of Bravecto® Plus van dezelfde (duo)verpakking.

NL-BRV-231100003 © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, Verenigde Staten en haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.