



13 handige bedrijfshygiënetips op het paardenbedrijf

Hoe meer je weet over besmettelijke paardenziekten, hoe groter de dreiging lijkt te zijn. Preventie en goede hygiëne zijn belangrijk om besmettelijke ziekten, zoals influenza, rhinopneumonie en droes buiten de staldeuren te houden. Toch is het soms niet eenvoudig om alle aanbevelingen op het vlak van bedrijfshygiëne in de praktijk toe te passen.

Bij de dagelijkse bescherming van onze paarden gaat het niet altijd om wat het beste is, maar meer om 'wat haalbaar en uitvoerbaar is met onze beperkte tijd en middelen'. Want wees eerlijk, wie heeft er na een drukke werkdag nooit eens een goede poetsbeurt overgeslagen?

Met die gedachte hebben we 13 praktische en haalbare tips voor je op een rijtje gezet om besmettelijke ziekten buiten de staldeuren te houden. Voor het gemak hebben we wel rekening gehouden met:

- wat je absoluut zou moeten doen.
- hoe je die maatregelen het beste kan inpassen in het dagelijks leven.

13 handige tips om infectieoverdracht te verminderen:

Vermijd neus-neuscontact

1]

Om overdracht van ziekten te verkleinen is het vermijden van neus-neuscontact bij paarden cruciaal. Bedrijfshygiëne en preventie lijken alleen noodzakelijk wanneer paarden blootgesteld worden aan een verhoogd risico om ziek te worden. Bijvoorbeeld tijdens een uitbraak van influenza, rhinopneumonie of droes bij je in de buurt, maar in sommige gevallen is het dan al te laat. Preventie en hygiëne zijn zaken die iedere dag moeten worden opgevolgd en toegepast, niet alleen wanneer er een besmettelijke ziekte uitbreekt.

Maak samen met je dierenarts een stal- of bedrijfsplan

2]

Ga eens kritisch na hoe een ziekte jouw stal of bedrijf binnen zou kunnen komen of hoe jouw paarden kunnen worden blootgesteld aan overdrachtsrisico's zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Bedenk vervolgens wat je zelf kunt doen om deze risico's terug te dringen. Voor een goede beheersing van infectieziekten kan je het beste samen met je dierenarts een stal- of bedrijfsplan maken dat bij jouw paard en (bedrijfs)situatie past. Er bestaat daarvoor geen standaardplan. Vraag je dierenarts om de stal te beoordelen en na te gaan of er mazen in het huidige preventiebeleid zitten. Leg het nieuwe plan vast, zet het om in actiepunten om insleep van buitenaf te verkleinen en communiceer dit duidelijk naar andere stalgenoten.

3

Deel geen materialen

Gebruik voor elk paard zoveel mogelijk eigen verzorgingsmaterialen (borstels, sponzen), eigen harnachement (hoofdstellen, dekjes, halsters) en reinig het leer na gebruik. Was zadeldekjes, handdoeken, bandages en halsterbontjes tenminste een keer per week op minimaal 60°C. Deel geen materialen met andere paarden!

4

Let op ongedierte

Paarden en mensen vormen niet het enige risico om ziekten over te brengen! Ook ongedierte vormt een risico. Houd voertonnen gesloten en voorkom stilstaand water om knaagdieren en insecten tegen te gaan. Ongedierte zoals muizen, ratten, vliegen, dazen en muggen kunnen verschillende besmettelijke ziekten overdragen, zoals bijvoorbeeld het West-Nijlvirus (muggen) en leptospirose (knaagdieren).

5

Vaccineer!

Nederland heeft de hoogste paardendichtheid ter wereld: maar liefst 25 paarden op 1.000 inwoners. Helaas is de vaccinatiegraad slechts 52%. Om een goede groepsimmunitet te verkrijgen moet de vaccinatiegraad minimaal 70% zijn. Jaarlijks worden er paarden ziek die niet of niet correct zijn gevaccineerd. Zelfs paarden die nooit van het terrein afkomen, kunnen worden blootgesteld aan ziektekiemen: via andere paarden (die wel soms van het terrein gaan of die passeren), mensen (die contact hebben gehad met andere paarden), besmette insecten (bijvoorbeeld het West-Nijlvirus of via de lucht (bijvoorbeeld influenza). Vaccinatie is vaak de makkelijkste maatregel die kan helpen om het infectierisico zo veel mogelijk te beperken.

6

Houd opfokpaarden apart van de sportpaarden

Houd paarden die actief en veelvuldig het bedrijf verlaten en weer terugkomen na een wedstrijd of trainingssessie apart van de opfokpaarden en fokmerries die permanent op het bedrijf verblijven.

7

Gebruik geen hogedrukreiniging bij het reinigen van de stal

Met hogedrukreiniging dood je geen ziekteverwekkers. Sterker nog, bij hogedrukreiniging kunnen bacteriën zelfs worden verspreid in hoekjes en kieren, omdat je ze verstuift en een vochtige, aangename leefomgeving voor de bacteriën creëert. Bovendien zijn gladde oppervlakken die vrij van organische materialen als mest en stof zijn, het makkelijkst te reinigen. Hogedrukreinigers kunnen dit gladde oppervlak aantasten, waardoor het in de toekomst moeilijker wordt te desinfecteren.





8] Wanneer er nieuwe paarden op je bedrijf komen, isoleer deze dan van paarden die permanent op het paardenbedrijf verblijven. Controleer de nieuwkomers bovendien altijd op ziektesymptomen. Temperatuur de nieuwe paarden twee keer per dag rond hetzelfde tijdstip.

Vraag stalbetreders hun handen te wassen voordat ze je paard aanraken

9] Hoefsmeden, dierenartsen, zadelpassers, fysiotherapeuten en andere stalbetreders, zoals instructeurs of mensen die even jouw paard komen vlechten of scheren, kunnen zeer makkelijk ziekten verspreiden als ze geen voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Deze personen gaan immers van het ene paard en paardenbedrijf naar het andere en kunnen daardoor gemakkelijk ziektekiemen overbrengen. Laat stalbetreders dus tenminste hun handen goed wassen voordat ze bij jou op stal komen.

Vervoer geen vreemde paarden in je eigen veewagen of trailer

10] Zet je paard na de proef direct weer op de wagen en neem nooit vreemde paarden mee in jouw trailer of veewagen. Doe dit uitsluitend wanneer deze niet in contact kunnen komen met je eigen paarden. Schrob en desinfecteer de binnenzijde van de trailer of veewagen grondig en droog deze goed nadat er een vreemd paard in heeft gestaan.

Reinig een tijdelijke box voordat je je paard erin huisvest

11] Wanneer je je paard tijdelijk moet onderbrengen in een andere stal (bijvoorbeeld voor vakantie, tijdens wedstrijden etc.), reinig de box dan grondig voordat je je paard erin zet. Het van boven tot onder schrobben van de muren van een wedstrijdstal is misschien niet realistisch, maar het desinfecteren van ruimtes waar paarden de meeste tijd verblijven, verdient wel de voorkeur. Reinig in ieder geval de voorzijde van de box alsook de deuren. Controleer de drink- en waterbak en sluit deze eventueel af.

Temperatuur je paard regelmatig

12] Weet jij hoe je jouw paard moet temperen en wat de normale temperatuur van je paard is? De normale temperatuur van paarden ligt tussen 37,2°C en 38,3°C. Als je de standaardtemperatuur van je paard kent, zie je al snel wanneer er iets mis is.

Controleer je paard dagelijks op klinische afwijkingen

13] Zo kan je een mogelijke infectieziekte snel herkennen. Niet willen eten, sloomheid, depressie, koorts, neusuitvoering, hoesten, diarree, acute huiduitslag of neurologische veranderingen zijn mogelijke tekenen dat er iets mis is. Neem bij twijfel altijd contact op met je dierenarts.