


Vogelmijtbesmettingen? Balen!



Vogelmijten houden zich vaak verstoppt, waarbij ze stro-, vlas-, of motbalen niet overslaan. Herbesmetting met nieuwe mijten is dan zo geïmagineerd. Een vogelmijtbesmetting is niet alleen balen voor de kip, maar ook voor uw portemonnee en dat wilt u vast niet! Met deze tips kunt u vogelmijtbesmettingen in strobalen en andere afleidingsmaterialen zoveel mogelijk voorkomen.

HANDIGE TIPS EN WEETJES

- Weet wat u de stal inbrengt. In balen stro, vlas, hooi, mais, luzerne en krullen die opgeslagen liggen, kunnen vogelmijten zich eenvoudig verstoppen en lang overleven. Wanneer u deze balen vervolgens de stal inbrengt, verhoogt u het risico op (her)introductie van vogelmijten.
- Vogelmijten nestelen zich liever in vochtig dan droog strooisel!
- Gebruik bij nieuwe koppels nooit reeds gebruikte afleidings-materialen. Insleep van vogelmijten of andere virussen en bacteriën kan dan eenvoudig plaatsvinden.
- Strooi geen kippenmest van een stal die besmet is met vogelmijten in de directe omgeving van de stal. Uw stalomgeving kan dan besmet worden.
- Laat uitsluitend vervoersmiddelen op uw bedrijf komen die van binnen en van buiten schoon zijn, zodat stro, vlas of ander afleidingsmateriaal tijdens het transport niet besmet kan raken.
- Heeft u paarden met jeuk op uw bedrijf? Denk dan ook aan vogelmijten! De strobalen die uw paarden krijgen, kunnen door (hobby)kippen besmet zijn geraakt met vogelmijt.
- Dek uw stro of ander afleidingsmateriaal goed af. Onafgedekt stro dat in schuren of buiten ligt opgeslagen, vormt een groter risico op vogelmijt.

