



DROESPROTOCOL



(STAL) PROTOCOL

Paard/pony met verdenking van droes

STAP 1
Isolatie. De isolatie afstand dient minimaal 10 meter te zijn.

STAP 2
Laat de dierenarts het paard onderzoeken om vast te stellen of het om droes gaat.

- Houd het paard in isolatie.

STAP 3
Informeert de paardeneigenaren over droes en de maatregelen die op het bedrijf zullen ingaan om verspreiding te beperken.

- Sluit de stal voor de aan- en afvoer van paarden.
- Informeert ook bezoekers over de uitbraak en de maatregelen.

STAP 4
Controleert en bekijkt alle paarden in de stal en deelt de paarden op in drie groepen.

STAP 5
Hygiëne maatregelen.

- Verzorg eerst de paarden uit de groene groep, daarna uit de oranje en als laatste uit de rode groep.
- Zorg voor aparte materialen per groep en label deze duidelijk.
- Zorg voor een strikte naleving van alle isolatie- en hygiëne maatregelen.

ROOD

- Hoog risico.
- Het paard heeft droes verschijnselen.
- Isoleer snel.

ORANJE

- Matig risico.
- Het paard is (mogelijk) in contact geweest met een ziek paard.
- Temperatuur alle paarden twee keer per dag. Bij een lichaamstemperatuur boven de 38,5 °C (of andere droesverschijnselen) verplaatst u het paard naar de rode groep.

GROEN

- Laag risico.
- Het paard heeft geen contact gehad met paarden uit de rode of oranje groep.
- Blijf deze paarden monitoren. Wanneer er droesverschijnselen optreden of het paard koorts krijgt, voegt u het desbetreffende paard meteen toe aan de rode groep.
- Bespreek met uw dierenarts de mogelijkheid van vaccinatie in deze groep.

STAP 6

- Houd het bedrijf minimaal 4, maar liefst 6 weken gesloten nadat het laatste paard genezen is.
- Paarden uit de rode groep kunnen drager worden en de droesbacterie met tussenpozen blijven uitscheiden. Uw dierenarts kan het paard hierop controleren.

MANAGEMENTADVIEZEN VEULENS

- Veulens, jaarlingen en 2-jarigen scheiden van de volwassen paarden.
- Opfokgroepen:
 - Niet te groot (stabiele groepen).
 - Groepsindeling op basis van geslacht en leeftijd.
 - Eerste opvang in kleine groepjes.
 - Indien nodig: individuele stalling.
- Zorg voor een optimale gezondheid van de veulens en jaarlingen.
 - Voldoende beweging.
 - Goede voeding.
 - Ruime, frisse en droge stallen.
 - Goed veterinair management (Influenza/tetanus en juist ontwormen).

LET OP:

- Verspreiders van droes vertonen niet altijd de bijbehorende klinische symptomen.
- Droes is geen aangifteplichtige ziekte, maar neem verantwoordelijkheid.

TIP: VACCINEER ALLE PAARDEN IN DE KOPPEL OF IN EEN STAL (TER VERLAGING VAN DE INFECTIEDRUK)



PREVENTIE VAN DROES DOOR VACCINATIE

- Basisvaccinatie
 - Vaccineer veulens vóór het spenen of na aankomst bij de veulenopvang/opfok.
- Herhalingsvaccinatie
 - De periode tussen de herhalingsvaccinaties is afhankelijk van het risico dat paarden op uw bedrijf lopen. Vraag uw dierenarts om advies.
- Bij uitbraak
 - Vaccineer enkel gezonde paarden. In sommige gevallen kan er tijdens een uitbraak gevaccineerd worden. Vraag uw dierenarts om advies.