

Bovilis® LONGWORM,



SUSPENSIE VOOR ORALE TOEDIENING VOOR RUNDEREN

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet UK Ltd
Walton Manor
Walton Milton Keynes
Bucks MK7AJ
United Kingdom

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Bovilis Longworm, suspensie voor orale toediening voor runderen

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per dosis van 25 ml:

Werkzaam bestanddeel:

Minstens 1000 bestraalde levende *Dictyocaulus viviparus* larven (derde stadium, L3).

4. INDICATIE

Actieve immunisatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken tegen parasitaire bronchitis, veroorzaakt door *Dictyocaulus viviparus*.

Immuniteitsduur:

3 maanden na vaccinatie volgens voorschrift.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Een lichte respiratoire vaccinatiereactie kan voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Orale toediening van één flacon (een dosis van 25 ml).

Vaccinatieschema:

Tweevoudige vaccinatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken met telkens een dosis per dier, met een interval van 4 weken.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Vanaf de eerste toediening tot 14 dagen na de tweede toediening dienen geen anthelmintica die werkzaam zijn tegen *Dictyocaulus viviparus* in het dier aanwezig te zijn.

10. WACHTTERMIJNEN

(Orgaan)vlies: Nul dagen.
Melk: Nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2 °C -8 °C.

Voorkom bevriezen.

Beschermen tegen licht.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

Vaccineer uitsluitend gezonde dieren.

Na de tweede vaccinatie dient men 2 weken te wachten voordat de gevaccineerde dieren in een gecontamineerd milieu gebracht kunnen worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Vanaf de eerste toediening tot 14 dagen na de tweede toediening dienen geen anthelmintica die werkzaam zijn tegen *Dictyocaulus viviparus* in het dier aanwezig te zijn.

Gebruik tijdens dracht:

De veiligheid van het middel is niet bewezen tijdens de dracht.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel anders dan genoemd onder Speciale waarschuwingen. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antiodota), indien noodzakelijk:

Bij dubbele dosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder "Bijwerkingen".

Onverenigbaarheden:

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

25 september 2009

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

REG NL 3219

KANALISATIE

UDD