

regumate
PIG

Samen
blij met een
volle box






“Met Regumate Pig werken we samen aan een optimale instroom van uw fokgelten”

Varkensteam MSD Animal Health

Hoe ziet de voortplantingscyclus van een zeug eruit?

De voortplantingscyclus van de zeug is weergegeven in onderstaande afbeelding:



Hormoonspiegels in de cyclus van een gelt


In de cyclus van de zeug zijn verschillende hormonen betrokken. Nadat de zeug berig is geweest (en dus eisprong heeft op dag 0), stijgt het hormoon progesteron dat geproduceerd wordt door het gele lichaam (corpus luteum). Dit gele lichaam is de plek op de eierstok van de zeug waaruit een eicel is vrijgekomen. Wanneer er een dracht optreedt, blijven de gele lichamen intact en wordt de zeug niet meer berig.

Indien er geen dracht is opgetreden, zorgt het hormoon prostaglandine (geproduceerd door de baarmoederwand) ervoor dat de gele lichamen verdwijnen en het hormoon progesteron afneemt. Hierdoor stijgen de hormonen FSH en LH waardoor de follikels (waarin de eicel zich ontwikkelt) op de eierstokken zich kunnen ontwikkelen en op hun beurt het hormoon oestrogene gaan produceren, zodat er uiteindelijk een eisprong kan plaatsvinden.

Hoe werkt Regumate Pig?

Regumate Pig imiteert de effecten van het hormoon progesteron en zorgt ervoor dat de gelt tijdens de behandeling niet berig wordt.

Omdat elke fokgelt op een ander tijdstip volwassen wordt, treedt binnen een koppel op verschillende momenten berigheid op. Een koppel gelten heeft dus nooit een gelijk lopende cyclus zonder gebruik van Regumate Pig. Dit bemoeilijkt een gelijkmatige instroom in de zeugenstapel. Door een 18 daagse behandeling met Regumate Pig, synchroniseert u de berigheid van een koppel. Hierdoor kunt u uw gelten en zeugen dus tegelijkertijd insemineren.



Het synchronisatie effect van Regumate® Pig

Wat zijn voor mijn bedrijf de voordelen van het synchroon berig worden van zeugen en gelten?

- Synchronisatie van berigheid zorgt voor een verhoogd % succesvol geïntroduceerde gelten, een gemakkelijke dekplanning en bespaart tijd.
- Controle in de kraamstal loont bij gelijktijdig werpen van zeugen en gelten.
- Een korte periode van werpende zeugen voorkomt te vroeg gespeende biggen.
- Met een strakke dekplanning hoeft u tijdens de werpdagen niet meer te insemineren. U heeft dus alle tijd voor optimale verzorging van zeug en big.
- Regumate Pig is zeer smakelijk. De gelten komen de portie zonder stress bij u ophalen, ook in groepshuisvesting.
- Toediening is extra gemakkelijk met het Regumate Pig doseerpistool.





Wat levert het gebruik van Regumate Pig op?

- Minder arbeid.
- Meer overzicht tijdens het werken.
- Betere berigheid detectie.
- Verhoging van de technische resultaten.
- Koppels biggen met een uniforme leeftijd.

Is Regumate Pig alleen voor bedrijven met een meerwekensysteem?

Nee, Regumate Pig is toepasbaar op elk bedrijf dat op zoek is naar meer structuur. Regumate Pig maakt een strakke dekplanning mogelijk, waardoor de verschillende groepen zeugen (batches) gescheiden blijven. Het maakt dan niet uit of een batch zeugen per week of meerdere weken (2,3,4,5,7 weken) wisselt. Het managen van uw bedrijf in batches geeft meer overzicht en maakt bijsturen eenvoudiger.

Samen maken wij een plan!

Indien u meer wilt weten over batchmanagement of wekensystemen of dit wilt invoeren op uw bedrijf, dan helpen wij u graag. Samen met u en uw dierenarts maken wij dan een plan om u te helpen met het overschakelen van uw bedrijf. Uw dierenarts informeert u graag verder.

Regumate Pig bevat per ml 4 mg Allyltrenbolon (Altrenogest) Helderere, lichtgele, geurloze oplossing. **Doeldier:** Varken **Indicatie:** Oestrussynchronisatie en –sturing in cyclische gelten. **Toediening en dosering:** 5 ml (20 mg altrenogest) per dier, gedurende 18 dagen. Verwijder de Schroef dop en de afsluiter. Meet de klinische dosis van 5 ml af met de doseerbeker. Giet de dosis over het voer. Sluit na gebruik de flacon met de afsluiter en de Schroef dop. **Bijwerkingen:** Niet bekend **Waarschuwingen:** Geen **Contraindicaties:** Niet gebruiken bij dieren met metritis. **Wachtijd:** (Orgaan)vlees: 9 dagen. REG NL 5745 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter.

Muisjes op bestelling? Regumate Pig!



Samen sterk in diergezondheid