

Geen vlieg kwaad, of toch wel?



In de lente zijn er nog relatief weinig vliegen, maar zodra de temperatuur stijgt komen er snel meer bij. Vliegen vermeerderen zich bij temperaturen boven 12°C. Wanneer er geen actie wordt ondernomen tegen vliegen, kan de vliegenpopulatie na een maand een hinderlijke omvang bereiken en overlast en onrust veroorzaken. Zonder bestrijding neemt het aantal vliegen na de lente snel toe en bereikt het een maximum van juni tot november.

Vliegen kunnen naast ziektekiemen, bacteriën en virussen ook zoönosen (ziekten die overgaan van dier op mens) verspreiden. Daarnaast zorgen deze vervelende zoemers en prikkers voor een verminderd dierenwelzijn van uw koppel en kunnen ze ook productieverliezen veroorzaken. Voorkom dan ook vliegenoverlast met de volgende tips.

Hygiënetips ter voorkoming van vliegenoverlast

Verwijder zoveel mogelijk broedplaatsen!

ALGEMEEN

- Houd centrale gangen, ruimten en de omgeving van silo's schoon en droog.
- Reinig regelmatig alle schrobputjes.
- Zorg dat deuren en ingangen goed afgesloten zijn (gebruik horren of rubberflappen bij deuren en uitloopopeningen om vliegen buiten de stal te houden).
- Voorkom vorming van (tuin)afvalhopen.
- Sla afval op in afgesloten containers.
- Voer kadavers snel af.
- Houd uw koppel in goede gezondheid.

MEST


- Draai mest regelmatig af en verwijder harde mestkoeken.
- Dek mesthopen af met folie en zorg dat mestcontainers dicht zijn.
- Vul loze ruimtes in de stal op met cement, zodat daar geen mestresten in achter kunnen blijven.

VOER EN WATER:

- Ruim gemorst voer zo snel mogelijk op of gebruik een voersysteem waar weinig gemorst kan worden.
- Repareer lekkende waternippels direct.

WIST U DAT...

- Er wel 100 soorten vliegen bestaan? Dat daarbij de huisvlieg en de stalvlieg het meeste voorkomen en dat stalvliegen hun gastheren bijten en bloed zuigen?
- Dat vliegen mogelijk ook betrokken zijn bij de overdracht van het Aviaire Influenzavirus, maar ook Salmonella, Vlekziekte, campylobacter en *E. coli* kunnen overbrengen?
- Afhankelijk van het seizoen, 2 vliegen zich binnen één maand voortplanten tot een populatie van 200 vliegen? Dat betekent 1 miljoen vliegen binnen 4 maanden.
- Vliegen boven de 17°C beginnen met vliegen en boven de 30°C de vliegactiviteit weer afneemt?
- Vliegen niet houden van luchtverplaatsingen?
- Vliegen per dag wel 20 km kunnen afleggen en zo dus gemakkelijk infecties kunnen overbrengen naar uw bedrijf of buurtbedrijven?
- Zwaluwen zeer goede vliegenvangers zijn en één zwaluwkuiken wel 150.000 insecten (waaronder vliegen) nodig heeft om groot te worden? En dat het zorgen voor nestelmogelijkheden in de naaste omgeving van een boerderij een bijdrage kan leveren aan de controle hiervan?
- U eenvoudig en goedkoop zelf petflessen kunt recyclen tot effectieve vliegenvangers?



Van petfles tot vliegenvanger...

Lees voor meer vliegenbestrijdingstips ook de factsheet kadavermanagement.