

# Billy gaat op kadavercruise...



Ooit op cruisevakantie geweest? Billy wel! Hij is regelmatig te vinden aan boord van de kadaveremmer. De perfecte wijze om makkelijk van de ene stal naar de andere verscheept te worden. Kadavers die in de stal blijven liggen, zijn een goede schuilplaats voor vogelmijten. Bij verwijdering van de kadavers kunnen onderweg vogelmijten uit de kadavers vallen en andere plaatsen van de stal besmetten. Om vogelmijt zoveel mogelijk tegen te gaan, hierbij tips tegen de kadaver-cruisetrucjes van Billy!

## TIPS KADAVERMAGEMENT:

- Verwijder dagelijks de kadavers. Kadavers zijn goede schuilplaatsen voor vogelmijten. Dode kippen trekken daarnaast ongedierte aan, zoals knaagdieren, mijten, vliegen en kevers die eventuele ziektekiemen in de stal kunnen verspreiden.
- Plaats de kadaveropslag nooit tegen de stal. Indien dit niet mogelijk is, zorg dan voor maatregelen, zodat vogelmijten die zich in de kadavers schuilhouden, niet opnieuw de stal binnen kunnen komen.
- Verwijder dode dieren direct uit de stal en berg ze op in de koeling.
- Voorzie een verharde plaats bij de ingang van het erf voor de kadaverton. Wetgeving geeft aan dat destructiewagens uw bedrijf niet op mogen rijden om de besmettingsrisico's te verkleinen.
- Reinig en ontsmet de kadaveropslagplaats nadat de dode dieren zijn opgehaald. Ga bij gekoelde containers na bij welke temperaturen de ontsmettingsmiddelen nog werkzaam zijn.

## TIP

Rode vogelmijten worden regelmatig op dode dieren aangetroffen. Vaak verstopten ze zich in de mondholte, neus, oren, cloaca, keel, op de poten en tussen de rugveren. De kadaveremmer is dan ook de perfecte schuilplaats voor vogelmijten. Laat deze emmer niet in de stal staan, maar leeg deze dagelijks.