

Doseer prettig met de handige pomp van Halocur


Voor comfortabel en veilig gebruik

Zachte ronde nozzle



DIERVRIENDELIJK

Vloeistof goed zichtbaar



NAUWKEURIG
DOSEREN

Ergonomische grip



GEBRUIKS-
VRIENDELIJK




Rond ergonomisch design


De nozzle heeft een vaste, stabiele positie.

GEbruIKSINSTRUCTIE


Doseer
ijj al juist?



1 Draai de pomp op de flacon op de flacon




2 Houd de nozzle in verticale positie



3 Druk de pomp 4 x in en het is klaar voor gebruik

Met Halocur krijg je cryptosporidiose onder controle!

Halocur werkt zowel preventief als curatief en blokkeert de levenscyclus van *Cryptosporidium parvum*. Op die manier wordt diarree veroorzaakt door *C. parvum* voorkomen en onder controle gehouden. Halocur voorkomt tevens de vorming van oöcysten, waardoor de infectiedruk in de omgeving lager wordt.



De voordelen van Halocur:

Zo nauwkeurig mogelijk doseren

- Onderdeel van complete aanpak in kalverdiarree
- Al 15 jaar bewezen effectief
- Draagt bij aan een gezonde start voor kalveren
- Ergonomisch handvat



Ga direct aan de slag met een complete en preventieve aanpak in kalverdiarree.

www.my-msd-animal-health.nl/rundvee

Halocur[®], bevat per ml: 0,50 mg halofoghone base (als lactaat zout). **Doel**dier: Rund. **Indicaties**: Preventie van diarree met als diagnose *Cryptosporidium parvum* op bedrijven met een voorgeschiedenis van cryptosporidiose. De toediening dient te starten binnen 24 tot 48 uur na de geboorte. **Reductie van diarree met als diagnose *Cryptosporidium parvum***. De toediening dient te starten binnen 24 uur na het ontstaan van de diarree. **Contra-indicaties**: Niet gebruiken op een lege maag. Niet gebruiken bij gevallen van diarree die reeds langer dan 24 uur aan de gang zijn en bij verzwakte dieren. **Bijwerkingen**: In zeer zeldzame gevallen is bij behandelde dieren een toename van de mate van diarree waargenomen. **Toediening en dosering**: Orale toediening aan kalveren na de voeding: 2 ml per 10 kg lichaamsgewicht eenmaal per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen. **Wachtermijn**: (Organ)vlees: 13 dagen. **Waarschuwingen**: Aangezien symptomen van toxiciteit reeds kunnen optreden bij een dubbele dosering dient de aanbevolen dosis strikt te worden aangehouden. REG NL 9808 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2018-10

 **MSD**
Animal Health
The Science of Healthier Animals[®]