




Behandelwaaier vruchtbaarheid







**In deze behandelwijzer
vindt u een overzicht van
behandelschema's voor:**

Baarmoederontsteking

- Endometritis en pyometra


Niet tochtige koeien

- Suboestrus en Cysteuze Ovariële Follikels (COF)

Verbetering van het drachtigheidspercentage

- Synchronisatie van oestrus en ovulatie
- Pre-Synch en OvSynch

Overige indicaties

- Partusinductie
 - Groepssynchronisatie
- 



Endometritis

Bij aanwezigheid van corpus luteum:

Estrumate 2 ml + Metricure



2 tot 5 dagen


Diagnose

Tochtig



Endometritis


Indien er geen corpus luteum aanwezig is:



**Indien geen tocht wordt waargenomen tien dagen na de behandeling nogmaals controleren op de aanwezigheid van een corpus luteum en indien nodig maatregelen nemen om tocht te induceren of de cyclus op te starten.*




Pyometra






Behandeling vlokjes na KI





Suboestrus

Bij aanwezigheid corpus luteum:





Cysteuze Ovariële Follikels (COF)

Receptal: 5 ml per dier

Receptal 5 ml



7 tot 9 dagen

Estrumate 2 ml



2 tot 5 dagen

Tochtig



KI






Verbetering van het drachtigheidspercentage


Receptal: 2,5 ml per dier

Toegediend tussen het begin van de oestrus tot en met het moment van KI






Synchronisatie van oestrus en ovulatie



* 'Blind' insemineren




PreSynch en OvSynch



* 'Blind' insemineren



Partus inductie





Groepssynchronisatie

Estrumate 2 ml



11 dagen

Estrumate 2 ml



2 tot 5 dagen

Tochtig



KI*



* 'Blind' insemineren



Estrumate™

De kracht van cloprostenol

- Lange halfwaardetijd
- Hoge dosis d-cloprostenol

Breed inzetbaar

- Suboestrus
- Cysteuze ovariële follikels
- Endometritis, pyometra
- Synchronisatie
- Partus inductie
- Inductie van abortus

Vertrouwd

- Veel wetenschappelijke data
- Gedocumenteerde ervaringen in diverse veldsituaties





Receptal®

Krachtig

- Hoge pre-ovulaire LH piek
- Optimale ovulatie inductie

Breed inzetbaar

- Meerdere toepassingen
- Meerdere diersoorten
- Complete reeks presentaties

Vertrouwd

- Veel wetenschappelijke data
- Gedocumenteerde ervaringen in diverse veldsituaties

Veilig

- Geen bijwerkingen
- Geen wachttijd





Metricure®

Effectief in de hele baarmoeder

- Werkzame concentraties in baarmoederlumen en -wand





Estrumate™, bevat per ml: 250 µg Cloprostenol (als cloprostenolnatrium). **Doeldier:** Rund. **Indicaties:** Baarmoederontsteking of pyometra, suboestrus, oestrussynchronisatie, onderbreking van ongewenste dracht, luteale cysten, partusinductie. **Bijwerkingen:** Geen bekend. **Toediening en dosering:** Per injectie: 0,5 mg cloprostenol (2 ml product) per dier door intramusculaire injectie. **Wachttermijn:** (Orgaan)vlees: 1 dag, Melk: 0 dagen. **Waarschuwingen:** Bij de toepassing dient direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen. Indien de huid in aanraking komt met dit product, dient men de huid onmiddellijk goed met water af te spoelen. Zwangere vrouwen en CARA-patiënten lopen extra risico wanneer zij in aanraking komen met het product. Niet toedienen aan drachtige dieren indien een abortus niet gewenst is. REG NL 5293 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter.

Receptal®, bevat per ml: 0,0042 mg busereline-acetaat (overeenkomend met 0,004 mg busereline). **Doeldieren:** Rund, paard, varken en konijn. **Indicaties:** Rund: follikelcysten, met en zonder symptomen van nymphomanie. Verbetering van het drachtigheidspercentage, na injectie gegeven tussen detectie van oestrus en het moment van kunstmatige inseminatie. Synchronisatie van oestrus en ovulatie in cyclische runderen, voor op een vast tijdstip kunstmatige inseminatie in combinatie met prostaglandine F2α-toediening. Paard: cysteuze veranderingen van het ovarium, met en zonder verlengde of blijvende hengstigheid. Ovulatie-inductie voor een betere bepaling van het tijdstip van ovulatie en dekking. Varken: ovulatie-inductie na voorafgaande oestrussynchronisatie door spenen (zeugen) of door toepassing van een progestageen (gelten) dat gebruikt kan worden als onderdeel van een enkelvoudig vast tijdstip kunstmatige inseminatieprogramma. Konijn: verbetering van het conceptiepercentage. Ovulatie-inductie bij postpartum inseminatie. **Bijwerkingen:** Geen bekend. **Toediening en dosering:** Eenmalig via intramusculaire of subcutane injectie. **Wachttermijn:** 0 dagen. **Waarschuwingen:** Vanwege de hormonale effecten van busereline gedurende de zwangerschap dienen zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd niet met het product om te gaan. Vermijd contact met de huid en ogen. In geval van ongewilde aanraking met de huid dient deze onmiddellijk met water en zeep te worden gewassen. In geval van accidentele aanraking met de ogen dienen de ogen gespoeld te worden met water en, indien nodig, dient een arts te worden geraadpleegd. Varken: Indien het aangegeven tijdschema niet in acht wordt genomen, kan de vruchtbaarheid verminderd zijn. Zowel progestagenen als busereline mogen uitsluitend bij gezonde dieren worden toegepast. REG NL 105583 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter.

Metricure®, bevat per injector van 19 gram: 500 mg Cefapirine (als benzathinecefapirine). **Doeldier:** Rund. **Indicatie:** Symptomatische behandeling van endometritis vanaf 14 dagen na het afkalven. **Contra-indicatie:** Niet toedienen aan dieren met een bekende allergie voor cefalosporinen. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen overgevoelighedsreacties (waaronder lokaal en/of systemisch oedeem) optreden. **Toediening en dosering:** De inhoud van één injector intra-uterien inbrengen met behulp van een wegwerppipet. **Wachttermijn:** (Orgaan)vlees: 1 dag, Melk: 0 dagen. **Waarschuwingen:** In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoelighedsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. Niet geïndiceerd voor gebruik tijdens de dracht. Kan gedurende de lactatie worden gebruikt. REG NL 8522 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter.



Estrumate™



Receptal®



Metricure®

www.rundvee-msd-animal-health.nl

 **MSD**
Animal Health



UIN: 150960 Behandelwijzer Vruuchtbaarheid.
© Alle rechten voorbehouden. 2015