

BIJSLUITER

380589 R2

Bovilis® Longworm

Suspensie voor orale toediening voor runderen.

**1. NAAM EN ADRES
VAN DE HOUDER VAN
DE VERGUNNING
VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK
VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN
VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning
voor het in de handel
brengen:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk
voor vrijgifte:

Intervet UK Limited
Walton Manor
Walton Milton Keynes
Buckinghamshire, MK7 7AJ
United Kingdom

**2. BENAMING VAN HET
DIERGEENEESMIDDEL**

Bovilis Longworm suspensie
voor orale toediening voor
runderen

**3. GEHALTE AAN
WERKZA(A)M(E)
EN OVERIGE
BESTANDDE(E)L(EN)**

Per dosis van 25 ml:

Werkzaam bestanddeel:
Minstens 1000 bestraalde
levende *Dictyocaulus
viviparus* larven (derde
stadium, L3).

4. INDICATIE(S)

Actieve immunisatie van
kalveren vanaf de leeftijd van
6 weken tegen parasitaire
bronchitis, veroorzaakt door
Dictyocaulus viviparus.

Duur van de immuniteit:
3 maanden na vaccinatie
volgens voorschrift.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Een lichte respiratoire
vaccinatie reactie kan
voorkomen.
Indien u bijwerkingen
vaststelt, zelfs wanneer die
niet in deze bijsluiters worden
vermeld, of u vermoedt dat
het diergeneesmiddel niet
werkzaam is, wordt u
verzocht uw dierenarts
hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Rund

**8. DOSERING VOOR ELKE
DOELDIERSOORT,
TOEDIENINGSWEG(EN)
EN WIJZE VAN
GEBRUIK**

Orale toediening van één
flacon (een dosis van 25 ml).

Vaccinatieschema:

Tweevoudige vaccinatie van
kalveren vanaf de leeftijd van
6 weken met telkens een
dosis per dier, met een
interval van 4 weken.

**9. AANWIJZINGEN
VOOR EEN JUISTE
TOEDIENING**

Geen.

10. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: Nul
dagen.

Melk: Nul dagen.

**11. BIJZONDERE
BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaren in een koelkast
(2 °C – 8 °C).

Beschermen tegen
bevrozing.

Beschermen tegen licht.

Buiten het zicht en bereik van
kinderen bewaren.



12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

Vaccineer alleen gezonde dieren.

Na de tweede vaccinatie dient men 2 weken te wachten voordat de gevaccineerde dieren in een gecontamineerd milieu gebracht kunnen worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Vanaf de eerste toediening tot 14 dagen na de tweede toediening dienen geen anthelmintica die werkzaam zijn tegen *Dictyocaulus viviparus* in het dier aanwezig te zijn.

Dracht:

De veiligheid van het middel is niet bewezen tijdens de dracht.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel, anders genoemd dan in rubriek 12 "Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren".

Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Bij dubbele dosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd in rubriek 6 Bijwerkingen.

Onverenigbaarheden:

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

16 januari 2019

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

REG NL 3219

KANALISATIE

UDD