

12

ONTWORMING EN
12 WEKEN BESCHERMING
TEGEN VLOOIEN EN TEKEN

BRAVECTO® PLUS: PRECIES WAT KATTEN NODIG HEBBEN

- 12 WEKEN bescherming tegen vlooien en teken
- PLUS ontworming op maat
- PLUS behandeling van oormijt

**NU OOK
TEGEN OORMIJT!**

BRAVECTO®
PLUS

BUITENGEWOON BIJZONDER


 **MSD**
Animal Health

The Science of Healthier Animals®

ONTWORMINGSADVIES ESCCAP

Het advies van ESCCAP is om als onderdeel van preventieve zorg, een kat te ontwormen volgens onderstaand schema. De gemiddelde kat valt in risicogroep B (4x per jaar tegen spoelwormen). Ontwormen tegen spoelwormen is in het belang van de gezondheid van mens en dier. De larven van de kattenspoelworm kunnen namelijk de mens (vooral kinderen) besmetten en klachten veroorzaken. Katten raken besmet via de moedermelk, contact met grond (zoals de tuin) en door het eten van prooidieren of rauw vlees. Lintwormen bij katten vormen geen noemenswaardig risico voor de kat en de volksgezondheid. De ESCCAP richtlijnen geven daarom aan katten pas tegen lintworm te behandelen als de aanwezigheid van lintwormen of vlooiën is aangetoond, dus niet als standaard onderdeel van preventieve zorg.

Volg het onderstaande schema en geef huisdiereigenaren een advies op maat:



- Indien lintwormsegmentjes worden gezien rond de anus of op de ontlasting: ontworm tegen lintwormen en start vlooiënbestrijding.
- Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van hond of kat is een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies.
- Ruim de ontlasting direct op en deponeer dit in een container (gewoon afval) en niet in de groenbak.

Ontworming van kittens


- Ontwormen vanaf een leeftijd van 3 weken, waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het spenen, daarna maandelijks tot een half jaar leeftijd.
- Zogende poezen steeds tegelijk met de kittens ontwormen.

12

ONTWORMING EN
12 WEKEN BESCHERMING
TEGEN VLOOIEN EN TEKEN

BRAVECTO® PLUS: EEN PLUS VOOR PREVENTIEVE ZORG

De unieke samenstelling van **Bravecto® Plus** biedt de mogelijkheid om katten gemakkelijk te behandelen tegen vlooien en teken, en daarbij het algemene ontwormingsadvies van ESCCAP te volgen. Voor een gemiddelde kat volstaat één behandeling per 12 weken voor de preventieve zorg tegen vlooien, teken en wormen.¹



OOK WERKZAAM TEGEN OORMIJT

Bravecto® Plus kan gebruikt worden bij de behandeling van katten met oormijtinfestaties waarbij ook bescherming tegen vlooien en/of teken nodig is. Een éénmalige toediening is voldoende. Na 28 dagen wordt een controle aanbevolen om een herinfestatie uit te sluiten.

BRAVECTO® PLUS BIEDT VELE VOORDELEN:

- Bescherm tot 12 weken tegen vlooien en teken
- 12 weken gebruiksgemak verhoogt therapietrouw en daarmee dierenwelzijn²⁻⁴
- Werkt tegen spoel-, haak-, hartworm en oormijt
- Passend binnen het algemene ontwormingsadvies van ESCCAP¹
- Werkt systemisch; beschermt van kop tot staart
- Past uitstekend in een zorgplan
- UDA: alleen verkrijgbaar via de dierenarts



Referenties toevoegen:

1. ESCCAP Richtlijn 1 (2e druk) en ESCCAP richtlijn 3-4 (5e druk).
2. Lavan RP et al. J Vet Sci Technol. 2017; 8: 439.
3. Lavan RP et al. Parasit Vectors. 2017; 10: 284.
4. Lavan RP et al. Parasit Vectors. 2018; 11: 458.

Bravecto Plus bevat per pipet: 500/25, 250/12,5 of 112,5/5,6 mg fluralaner/moxidectine. **Doel/dier:** Kat. **Indicatie:** Voor katten met, of met risico op, gecombineerde parasitaire infestaties met teken of vlooien en oormijten, maagdarmpwormen of hartwormen. **Voor:** -behandeling van teken- (*Ixodes ricinus*) en vlooien- (*Ctenocephalides felis*) infestaties (ook bij vlooienallergiedermatitis) met een dodende werking gedurende 12 weken; - behandeling van infestaties met oormijten (*Otodectes cynotis*) - behandeling van infecties met intestinale rond- (*Toxocara cati*) en haakwormen (*Ancylostoma tubaeforme*); - voorkomen van hartwormziekten (*Dirofilaria immitis*) gedurende 8 weken. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of hulpstoffen. **Interacties:** Moxidectine is een substraat voor P-glycoproteïne. Combineer diergeneesmiddelen die P-glycoproteïne kunnen remmen (zoals cyclosporine, ketoconazol, spirosoad, verapamil) alleen met Bravecto Plus na baten/frisicobecordeling van de verantwoordelijke dierenarts. **Bijwerkingen:** - Milde voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek (≤ 1 - $<10\%$ van de behandelde katten): kaalheid, huidschilfers en jeuk; - Kort na toediening kortademigheid/versnelde ademhaling, kwijlen, braken, braken met bloed, diarree, sloomheid, koorts, verwijding van de pupil ($\leq 0,1$ - $<1\%$). **Toediening en dosering:** Voor spot-on gebruik. Pipet(ten) in overeenstemming met diergewicht. **Waarschuwingen:** Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner, het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten. Niet gebruiken bij kittens <9 weken en/of katten $<1,2$ kg. Niet oraal toedienen. Voorkom dat pas behandelde dieren elkaar schoonlikken. Draag handschoenen bij toediening en zorg ervoor dat de toedieningsplek op het dier droog en niet meer zichtbaar is voordat er weer contact is met de toedieningsplek. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens fok, dracht en lactatie. EU/2/18/224/001-006, REG NL 120324-120326 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2019-07.