

NIEUW: BRAVECTO® SPOT-ON HOND

Bravecto® spot-on voor de hond (fluralaner; UDA) is een nieuwe spot-on tegen vlooien en teken bij honden. Het heeft dezelfde naam, werkzame stof en werkingsduur als de Bravecto® kauwtablet voor de hond, maar een nieuwe toedieningsvorm.

Fluralaner is een werkzame stof uit de isoxazoline-klasse van ectoparasiticiden en wordt gemakkelijk transdermaal opgenomen vanuit de toedieningsplek. De systemische, zeer potente acaricide en insecticide werking houdt tot 12 weken aan. Omdat Bravecto® de volwassen vlooien snel doodt, stopt de productie van levensvatbare eieren en wordt de levenscyclus van de vlo doorbroken.

TOT 12 WEKEN LANG NON-STOP WERKING

Het duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden om een vlooieninfestatie onder controle te krijgen, mits de behandeling op tijd wordt herhaald. Helaas herhalen 8 op de 10 eigenaren de behandeling niet op tijd. Bravecto® verkleint de kans dat een herbehandeling te laat wordt uitgevoerd omdat het tot 12 weken lang non-stop werkt. Ontpoppende vlooien krijgen gedurende deze tijd geen kans zich voort te planten.

Bravecto® kan worden gebruikt bij fokhonden, drachtige en lacterende honden en ook bij honden met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR 1 -/-), zoals Collies.

FARMACEUTISCHE VORM EN SAMENSTELLING

Spot-on oplossing. Bevat fluralaner.

INDICATIES EN DOELDIER

Voor de systemische behandeling van teken- en vlooiëninfestaties bij honden.

Onmiddellijke en aanhoudende dodende werking tegen:

- *Ctenocephalides felis* en *Ctenocephalides canis* (12 weken); te gebruiken als onderdeel van een behandelstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis.
- *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* en *Dermacentor reticulatus* (12 weken).

Vlooiën en teken moeten gehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Binnen 8 uur na aanhechting van vlooiën (*C. felis*) en binnen 12 uur na aanhechting van teken (*I. ricinus*) treedt het effect op.

Dosering

Eén pipet per hond. Kies de juiste pipet bij het gewicht van de hond.

Bravecto® 112,5 mg (0,4 ml)	Bravecto® 250 mg (0,89 ml)	Bravecto® 500 mg (1,79 ml)	Bravecto® 1000 mg (3,57 ml)	Bravecto® 1400 mg (5,0 ml)
Honden van 2-4,5 kg	Honden >4,5-10 kg	Honden >10-20 kg	Honden >20-40 kg	Honden >40-56 kg

- Voor honden boven 56 kg lichaamsgewicht dient een combinatie van twee pipetten te worden gebruikt die het beste bij het lichaamsgewicht past.
- Dit product is voor topicaal gebruik en dient niet oraal toegediend te worden.
- Niet gebruiken bij pups jonger dan 8 weken en/of honden lichter dan 2 kg omdat hierover geen informatie beschikbaar is.

TOEDIENINGSINTERVAL

Het toedieningsinterval is 12 weken. Dien Bravecto® spot-on hond niet toe met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter toedieningsinterval niet is onderzocht.

OVERDOSERING

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen na topicale toediening bij pups met een leeftijd van 8-9 weken en een gewicht van 2,0 - 3,7 kg die op 3 momenten een overdosering toegediend kregen van tot 5 maal de maximaal aanbevolen dosering met een korter interval dan aanbevolen (interval van 8 weken).


GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE, FOK EN BIJ HONDEN MET MDR1-AFWIJKINGEN

De veiligheid van Bravecto® is bewezen bij fokhonden, drachtige en lacterende honden. Ook werd het diergeneesmiddel goed verdragen door Collies met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR1 -/-) na eenmalige orale toediening van 3 maal de aanbevolen dosering (168 mg/kg lichaamsgewicht).


CONTRA-INDICATIES EN BIJWERKINGEN

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Tijdens klinische studies werden milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek (1,2% van de behandelde honden), zoals roodheid of kaalheid waargenomen.


TOEDIENINGSINSTRUCTIE BRAVECTO® SPOT-ON HOND: DRAAI EN GEBRUIK!



Scheur de aluminium sachet open.




Houd de pipet met de dop omhoog. Knijp niet in de pipet.




Draai en gebruik: draai de knop 1x rond. Houd de pipet met de dop naar boven. De pipet is nu klaar voor gebruik.



Let op: de dop komt er niet af!



Het product dient bij honden aangebracht te worden op één plek (als volume klein is) of op verschillende plekken langs de ruglijn van de schouder tot de staartbasis. Voorkom toediening van meer dan 1 ml vloeistof op één plek omdat een deel van de oplossing van de hond af kan lopen.



Spreid de haren en druppel de hele inhoud van de pipet direct op de huid van de hond. Hoe beter u de inhoud van de pipet direct op de huid druppelt, hoe minder u het in de vacht ziet.

WAARSCHUWINGEN / OVERIGE INFORMATIE

- Om blootgesteld te worden aan fluralaner moeten parasieten zich beginnen te voeden op de gastheer; het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.
- Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen Bravecto® spot-on voor honden en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.
- Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product en ter bescherming tegen uitdroging of vochtopname. De sachets moeten pas vlak voor gebruik geopend worden. Er zijn geen andere speciale voorzorgen voor de bewaring.
- Het actieve bestanddeel in het product is zeer lipofiel en hecht aan de huid; na morsen kan het product ook aan oppervlakken hechten. Als voorzorg wordt daarom aanbevolen geschikte handschoenen te dragen bij het hanteren of het toedienen van het product en aansluitend handen met zeep en water te wassen. In geval van morsen, bijvoorbeeld op tafel of vloeroppervlakken, de overmaat aan product verwijderen met een papieren tissue en het gebied schoonmaken met zeep.
- Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
- Voorkom contact met huid en/of ogen, inclusief hand-oog contact. Dit product kan licht irriterend zijn voor de huid en/of ogen.
- Raak de toedieningsplek niet aan en voorkom dat kinderen deze aanraken totdat deze droog is.
- Laat de toedieningsplaats drogen voordat contact met leder, stof, kunststof en andere delicate oppervlakken wordt toegelaten. Dit helpt vlekken te voorkomen.
- Het product is zeer brandbaar. Houd het weg van warmte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

VERPAKKING

Kartonnen doos met daarin een aluminiumfolie sachet dat 1 pipet bevat.

KANALISATIESTATUS EN REGISTRATIENUMMERS

UDA. REG NL 116441-116445

ÉÉN KEER TOEDIENEN.
TOT 12 WEKEN BESCHERMD
TEGEN VLOOIEN EN TEKEN.

- Spot-on voor honden
- Bevat fluralaner
- Tot 12 weken systemisch werkzaam tegen vlooien en teken
- 12 weken therapietrouw
- Snelle werking
- UDA; dus exclusief voor de dierenarts



UIN 181486 H: Datasheet Bravecto Spot-on hond

Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar.
MSD Animal Health, Postbus 50, 5830 AB Boxmeer