



Checklist APP

Samen ruiken aan een succesvolle aanpak!

- Zorg voor een optimaal stalklimaat (vermijd grote temperatuurschommelingen en tocht. Zorg voor voldoende frisse lucht/ventilatie), maar voorkom een te hoge luchtsnelheid;
- Werk per afdeling strikt volgens het all-in/all-out principe (dus geen vermenging van dier- en leeftijdsgroepen);
- Betrek biggen van één herkomstadres;
- Gebruik per diergroep eigen materiaal (kleur of nummer het materiaal per diergroep om te voorkomen dat u het materiaal van de ene diergroep bij een andere gebruikt);
- Verplicht iedereen die de stal betreedt om vooraf te douchen en om voor iedere afdeling of diergroep een specifieke set kleding en laarzen te gebruiken;
- Stel APP door middel van bloedonderzoek vast. APP kan secundair optreden na een primaire infectie met circo, PRRS of *Mycoplasma hyopneumoniae*;
- Streef naar een optimale interne biosecurity. Ga ervan uit dat er in een koppel altijd dragerdieren aanwezig zijn. Dragerbiggen zijn het reservoir van APP en kunnen ook negatief testen bij bloedonderzoek. In een APP-negatief getest koppel kunnen dus nog dragerdieren zitten bij aankomst/opleg;
- Plaats geen herstelde varkens terug uit de ziekenboeg. Zeker bij een APP-uitbraak is het beter om herstelde dieren uit de ziekenboeg niet terug te plaatsen bij de rest van uw varkens. Op deze manier voorkomt u (her)verspreiding.

