

BIJSLUITER

147274 R1

CHORULON®



**LYOFILISAAT EN OPLOSMIDDEL VOOR
OPLOSSING VOOR INJECTIE VOOR
RUNDEREN, PAARDEN EN HONDEN**



**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

of

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Chorulon, lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie voor runderen, paarden en honden.

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per 5 ml:

Werkzaam bestanddeel:

human Chorionic Gonadotrophin (hCG) 1500 of 5000 I.E.*

* I.E. = internationale eenheid

4. INDICATIES

Rund:

Behandeling van cysteus ovarium met als gevolg anoestrus, verlengde oestrus en/of nymphomanie ten gevolge van cysteuze follikeldegeneratie.

Paard:

- Behandeling van anoestrus met follikel groter dan 2 cm.
- Ovulatie-inductie ter verbetering van de conceptie.

Hond:

Vertraagde ovulatie en verlengde oestrus bij teven.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, paard en hond.

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN**

Intraveneuze, intramusculaire of subcutane injectie.

Het product reconstitueren door:

1500 I.E. hCG op te lossen in 5 ml oplosmiddel;
5000 I.E. hCG op te lossen in 5 ml oplosmiddel;
10.000 I.E. hCG op te lossen in 10 ml oplosmiddel.

- Rund:** éénmalig 3000 I.E. hCG, intraveneus.
- Paard:**
 - Behandeling van anoestrus: éénmalig 1500-3000 I.E. hCG, intramusculair of subcutaan.
 - Ovulatie-inductie: éénmalig 1500-3000 I.E. hCG, 24 uur voor de dekking of kunstmatige inseminatie, intraveneus.
- Hond:** éénmalig 100-500 I.E. hCG, intramusculair.

De corresponderende hoeveelheid product staat vermeld in onderstaande tabel.

Dosis	Volume gereconstitueerd product		
	Chorulon 1500 I.E.	Chorulon 5000 I.E.	Chorulon 10.000 I.E.
100 I.E.	0,3 ml	0,1 ml	0,1 ml
500 I.E.	1,7 ml	0,5 ml	0,5 ml
1500 I.E.	5 ml	1,5 ml	1,5 ml
3000 I.E.	10 ml	3 ml	3 ml

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTERMIJNEN

- Rund:** (Orgaan)vlees: nul dagen
 Melk: nul dagen
- Paard:** (Orgaan)vlees: nul dagen

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25 °C. Beschermen tegen bevroering. Beschermen tegen licht.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Gereconstitueerd product: bewaren bij 2 °C -8 °C, binnen 24 uur gebruiken.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Gebruik tijdens lactatie:

Kan tijdens de lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden:

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, behalve het oplosmiddel bijgevoegd voor gebruik bij het diergeneesmiddel.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

19 augustus 2015

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met glazen flacon(s) à 1500 I.E. hCG en glazen flacon(s) oplosmiddel à 5 ml.

Doos met glazen flacon(s) à 5000 I.E. hCG en glazen flacon(s) oplosmiddel à 5 ml.

Doos met glazen flacon(s) à 10.000 I.E. hCG en glazen flacon(s) oplosmiddel à 10 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel

worden gebracht.

REG NL 1249
KANALISATIE
 UDD



MSD
 Animal Health