

# Dimazon<sup>®</sup> tabletten

**40 mg voor honden en katten**

DIERGEENEESMIDDEL UDA

**VOOR DE BEHANDELING VAN OEDEEMVORMING, NIET OP  
ONTSTEKING BERUSTEND, BIJ HONDEN EN KATTEN**

## **SAMENSTELLING**

Per tablet:

Furosemide 40 mg

## **DOELDIEREN**

Hond, kat.

## **INDICATIES**

Bij oedeemvorming, niet op ontsteking berustend, in weefsels, lichaamsholten, gewrichten, peesscheden en dergelijke, zoals:

- Hydropericard, hydrothorax, ascites.
- Oedeem van preputium en scrotum.
- Cerebraal oedeem.
- Long- en bronchiaal oedeem.
- Oedemen ten gevolge van parasitaire aandoeningen.
- Bij chronisch nierfalen met oligurie.
- Ledematen- en wondedeem na ongevallen en operaties.

## **CONTRA-INDICATIES**

- Ernstige leverbeschadiging.
- Nierfalen met anurie.
- Hypokaliëmie.
- Hyponatriëmie.
- Hypovolemie.

## **DOSERING EN TOEDIENING**

Oraal.

Hond en kat: 1 tablet per 8 kg (5 mg/kg lichaamsgewicht/dag).

In ernstige of refractaire gevallen kan de dosering verdubbeld worden.



## **BIJWERKINGEN**

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## **WAARSCHUWINGEN**

- De drinkwateropname dient tijdens de duur van de behandeling niet te worden beperkt.
- Mogelijke interacties met andere medicijnen zijn: ototoxiciteit met aminoglycosiden, nefrotoxiciteit met cefalosporines, verhoogde toxiciteit van hartglycosiden en een verhoging van de plasmaspiegel van hartglycosiden. De combinatie met sulfonamiden kan leiden tot sulfonamide allergie. Combinatie van furosemide en digoxine leidt tot een gedaalde digoxine uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine. De dosis digoxine dient te worden verminderd.
- Doseringen hoger dan aanbevolen kunnen een tijdelijke doofheid veroorzaken. Cardiovasculaire bijwerkingen kunnen optreden na overdosering bij oudere en zwakkere dieren.



## **BEWARING**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.

## **VERWIJDERING**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## **VERPAKKING**

Dimazon tabletten zijn verkrijgbaar per 10 blisters van 10 tabletten (100 tabletten).

REG NL 5285

UDA

November 2011

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50

5830 AB Boxmeer

Een product van:

Intervet GesmbH

