

BUTOX PROTECT
7,5 mg/ml pour on

STOP VLIEGEN  **MET BUTOX® PROTECT**

Butox® Protect


- Werkzaam tegen vliegen en luizen
- Lange werkingsduur: tot 10 weken bij vliegen
- Voor rund en schaap
- Beschikbaar in flacons van 2,5 liter en 1 liter




UJIN: 111622

Waarom vroegtijdig behandelen?


Een effectieve vliegenbestrijding begint op het moment dat er weinig vliegen zijn, vervolgens de behandeling herhalen op het moment dat Butox® Protect is uitgewerkt. Daarnaast is het belangrijk om op stal naast Butox® Protect tevens maden- en vliengedodende middelen in te zetten.



Evolutie van vliegenpopulatie **zonder** behandeling



Evolutie van vliegenpopulatie **met curatieve** behandeling



Evolutie van vliegenpopulatie **met preventieve** behandeling

Butox® Protect, bevat per ml 7,50 mg deltamethrin. **Doel dieren:** Runder en schape. **Indicatie:** Behandeling en preventie van infestaties met: - bloedzuigende luizen (*Linognathus vituli*, *Linognathus ovis*, *Haematopinus eurysternus*); - bijtende luizen (*Bovicola bovis*, *Bovicola ovis*); - schapevluisvlieg (*Melophagus ovinus*). Controle van steekvliegen (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia* spp.) en overlast veroorzakende vliegen (*Musca* spp., *Hypobosc* spp.) bij runderen. **Contra-indicaties:** Resistentie tegen pyrethroiden. **Bijwerkingen:** Deltamethrin is irriterend voor de ogen en slijmvliezen. In zeer zeldzame gevallen kan huidirritatie (roodheid/jekel) gepaard gaan met rusteloosheid, hyperactiviteit, angst of overgevoeligheid en schudden met de staart waargenomen worden. **Toediening en dosering:** Enkelvoudige Pour on toediening op het midden van de rug van nek tot staart. Afhankelijk van de besmettingsgraad kan de behandeling tegen vliegen elke 6 tot 10 weken herhaald worden. **Wachtermijnen:** Rund (Orgaanvlees: 18 dagen, Melk: 0 dagen; Schaap (Orgaanvlees: 1 dag, Melk: 12uur. **Waarschuwingen:** Frequent en herhaaldelijk gebruik van insecticiden van dezelfde klasse gedurende een langere periode vermijden, gezien een toename van het risico op de ontwikkeling van resistentie, wat uiteindelijk kan resulteren in een ineffektieve therapie. Het product zal het aantal vliegen aanwezig op het dier verminderen, maar naar verwachting niet alle vliegen op een bedrijf elimineren. Deltamethrin is erg giftig voor insecten in de mest/schadelijk voor bijen, vissen en andere waterorganismen. Diergeneesmiddel. REG NL 104958 URA. Voor overige informatie, zie bijsluiter.