

GEEF VLIEGEN GEEN KANS



Butox[®] Protect

- Werkzaam tegen vliegen en luizen
- Lange werkingsduur: tot 10 weken bij vliegen
- Voor rund en schaa

Eenvoudige dosering:

Vliegen:

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Rundvee tot 100 kg | 10 ml |
| • Rundvee van 100 - 300 kg | 20 ml |
| • Rundvee boven 300 kg | 30 ml |

Luizen en schapenluisvlieg:

- | | |
|---------|-------|
| • Schaa | 10 ml |
|---------|-------|

Afhankelijk van de besmettingsgraad kunnen dieren om de 6-10 weken worden behandeld.



Butox[®] Protect

is beschikbaar in flacons van 2,5 liter en 1 liter.

STOP VLIEGEN MET BUTOX® PROTECT

Waarom ectoparasieten bestrijden?

Ectoparasieten zorgen voor meer dan overlast alleen en de schade die ze veroorzaken wordt meestal onderschat. Naast dat ze hinderlijk zijn en dierwelzijn aantasten hebben ze ook een economische impact.


Directe schade	Indirecte schade
Minder melkgift	Ziekten die door ectoparasieten worden overgebracht
Minder gewichtsaanzet	Onrust van de dieren, overlast
Schade aan leer of wol	Extra werk bij verzorgen



Waarom vroegtijdig behandelen?

Afhankelijk van het seizoen planten 2 vliegen zich binnen één maand voort tot een populatie van 200 vliegen. Dat betekent 1 miljoen vliegen binnen 4 maanden. Een effectieve vliegenbestrijding begint op het moment dat er weinig vliegen zijn (dus vroeg in het seizoen), vervolgens de behandeling herhalen op het moment dat Butox® Protect is uitgewerkt.

Daarnaast is het belangrijk om op stal naast Butox® Protect tevens maden- en vliegendodende middelen in te zetten.



Butox® Protect, bevat per ml 7,50 mg deltamethrin. **Doel dieren:** Runderen en schape. **Indicatie:** Behandeling en preventie van infestaties met: - bloedzuigende luizen (*Linognathus vituli*, *Linognathus ovis*, *Haematopinus eurysternus*); - bijtende luizen (*Bovicola bovis*, *Bovicola ovis*); - schapevluisvlieg (*Melophagus ovinus*). **Contra-indicaties:** Resistentie tegen pyrethroiden. **Bijwerkingen:** Deltamethrin is irriterend voor de ogen en slijmvliezen. In zeer zeldzame gevallen kan huidirritatie (roodheid/jeuk) gepaard gaan met rusteloosheid, hyperactiviteit, angst of overgevoeligheid en schudden met de kop en zwiepen met de staart waargenomen worden. **Toediening en dosering:** Enkelvoudige Pour on toediening op het midden van de rug van nek tot staart. Afhankelijk van de besmettingsgraad kan de behandeling tegen vliegen elke 6 tot 10 weken herhaald worden. **Wachtermijnen:** Runderen (Organvlees: 18 dagen, Melk: 0 dagen); Schape (Organvlees: 1 dag, Melk: 12 uur). **Waarschuwingen:** Frequent en herhaaldelijk gebruik van insecticiden van dezelfde klasse gedurende een langere periode vermijden, gezien een toename van het risico op de ontwikkeling van resistentie, wat uiteindelijk kan resulteren in een ineffektieve therapie. Het product zal het aantal vliegen aanwezig op het dier verminderen, maar naar verwachting niet alle vliegen op een bedrijf elimineren. Deltamethrin is erg giftig voor insecten in de mest/schadelijk voor bijen, vissen en andere waterorganismen. Diergeneesmiddel. REG NL 104958 URA. Voor overige informatie, zie bijsluiter.