

### Engemycine Spray, 25 mg/ml

Huidspray suspensie voor runderen, schapen en varkens.

**Samenstelling:** Een spuitbus met 200 ml product bevat per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Oxytetracyclinehydrochloride 25,00 mg

(overeenkomend met oxytetracycline) 23,15 mg

Hulpstof: Patent blue V (E131) als kleurstof 1,25 mg

**Farmaceutische vorm:** Huidspray, suspensie. Groen tot groen-blauwe suspensie.

**Indicaties:** Voor de behandeling van de volgende infecties veroorzaakt door, of geassocieerd met, organismen gevoelig voor oxytetracycline in runderen, schapen en varkens:

- Infectieuze klauwinfecties in het bijzonder veroorzaakt door: *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* en andere *Fusobacterium* spp., en *Bacteroides* spp.
- Ondersteunende behandeling van oppervlakkige wondinfecties na operatie of lichamelijke verwondingen, bijvoorbeeld staartbitten bij varkens, schrammen en schaafwonden.

**Contra-indicaties:** Niet gebruiken voor de behandeling van spenen om te voorkomen dat het diergeneesmiddel in melk terecht komt. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor oxytetracycline of één van de andere hulpstoffen.

**Bijwerkingen:** Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet op deze spuitbus worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**Doelrind:** Rund, schaap, varken.

**Dosering:** Alleen voor topicaal gebruik. Goed schudden voor gebruik. De spuitbus kan zowel rechtop als ondersteboven gebruikt worden. Voor toepassing de te behandelen oppervlakte schoonmaken, waarna het diergeneesmiddel 1-2 seconden, op een afstand van 15-20 cm gesprayd kan worden, totdat het gebied een homogene kleur heeft. Herhaal de behandeling elke 12 uur gedurende 1 tot 3 dagen, afhankelijk van het genezingsresultaat.

**Wijze van toediening:** Om de beste resultaten in geval van luesies van de ondervoet te verkrijgen worden de volgende adviezen gegeven:

- Maak het gebied aan de onderpoot helemaal schoon waarbij vuil, exsudaat en necrotisch weefsel worden verwijderd.
- Zorg voor een droge ondergrond gedurende 12 uur na elke behandeling.

**Wachttermijnen:** Rund, schaap en varken: (Organ)vlees: 0 dagen.  
Melk: 0 dagen.

Blauwgekleurde delen van de varkenshuid dienen verwijderd te worden, voordat de rest van het dier wordt gebruikt voor humane consumptie.

**Bewaring:** Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Spruitbus onder hoge druk: beschermen tegen direct zonlicht, niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Weg houden van open vuur/gloeien voorwerpen

- Niet roken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum vermeld op de spuitbus.

EOPC0207\_007 R2

Batch:

EXP:

Engemycine™ Spray

Engemycine™

Spray 25 mg/ml



Huidspray suspensie voor  
runderen, schapen en varkens  
Oxytetracyclinehydrochloride

200 ml



### Waarschuwingen:

**Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:**

Dieren dienen behandeld te worden in goed geventileerde ruimten.

Niet in of vlak bij de ogen sprayen.

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

**Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:**

Vanwege het risico op sensibilisatie en contactdermatitis dient de gebruiker huidcontact te vermijden.

Draag geschikte ondoorlaatbare handschoenen tijdens toediening van het diergeneesmiddel.

Vanwege het risico op oogirritatie dient contact met de ogen vermeden te worden. Bescherm ogen en gezicht.

Niet in open vuur of op gloeiend materiaal sprayen.

De bus niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

Dampen niet inademen.

Gebruik het product in de buitenlucht of in een goed geventileerde ruimte.

Handen wassen na gebruik.

Niet eten of raken tijdens de toepassing van het diergeneesmiddel.

In geval van accidentele inname of contact met ogen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

**Gebruik tijdens dracht en lactatie:**

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

**Verwijdering:** Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

REG NL 102670 (UDD)

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

**Registratiehouder:** Fabrikant verantwoordelijk voor wijzigte:

Intervet Nederland B.V.

Intervet Productions S.r.l.

Postbus 50

Via Nettunense, Km 20,300

5830 AB Boxmeer

04011 Aprilia (LT)

Italië



3

