



Goede berigheid

Zo zorgt u voor een goede berigheid.

- **Voorkom stress**

- Stress heeft een negatief effect op de hormonen die een goede berigheid stimuleren.
- Vermijd stress tijdens de inseminatie.
- Laat gelten tijdig wennen aan het staan in boxen en contact met mensen.
- Creëer rust in de stallen; ga kalm om met uw dieren.

- **Voerniveau**

- De conditiescore van uw dieren heeft invloed op de kwaliteit van zowel de berigheid als de eicellen.
- Zorg dat uw dieren in goede conditie in de dekstal komen.
- Geef flush-voer om uw dieren snel in een positieve energiebalans te brengen.
- Stem het juiste voerschema af met uw voerleverancier.

- **Gezondheidsstatus**

- Er zijn verschillende ziekten die kunnen leiden tot een verminderde vruchtbaarheid.
- Zorg voor frequente gezondheidsmonitoring.
- Werk met een op maat gemaakt vaccinatieschema (via uw dierenarts).

- **Stalklimaat**

- Vermijd tocht; tocht vormt een continue stressfactor.
- Voorkom koude dekstallen, zodat de zeug minder energie verbruikt om zichzelf warm te houden.
- Zorg voor periodieke klimaatmonitoring door een klimaatspecialist.

- **(Dag)licht**

- In de natuur worden zeugen en gelten alleen in het voorjaar berig.
- Houd de daglengte door middel van kunstlicht constant.
- Zorg in de dekstal voor min. 14 uur licht boven de kop van de zeug (min. 100 lux).

- **Zoekbeer**

- Zorg voor een actieve zoekbeer.
- Gebruik een beer van min. 10 maanden oud met genoeg bereigneur.
- Laat de zoekbeer bij voorkeur 1x per week dekken (slachtzeug) om hem actief te houden.
- Voorkom gewenning: zorg dat de beer niet steeds in contact staat met zeugen en gelten in de dekstal.