

## BRAVECTO® SPOT-ON KAT

Bravecto® voor de kat (fluralaner; UDA) is een nieuwe spot-on tegen vlooien en teken bij katten. Het heeft dezelfde naam, werkzame stof en werkingsduur als de Bravecto® kauwtablet voor de hond, maar een nieuwe toedieningsvorm. Fluralaner wordt gemakkelijk transdermaal opgenomen van de toedieningsplek en de systemische, zeer potente acaricide en insecticide werking houdt tot 12 weken aan. Fluralaner is een werkzame stof uit de isoxazoline-klasse van ectoparasiticiden. Omdat Bravecto® de volwassen vlooien snel doodt, stopt de productie van levensvatbare eieren en wordt de levenscyclus van de vlo doorbroken.

Het duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden om een vlooieninfestatie onder controle te krijgen, mits de behandeling op tijd wordt herhaald. Helaas herhalen 8 op de 10 eigenaren de behandeling niet op tijd. Bravecto® verkleint de kans dat een herbehandeling te laat wordt uitgevoerd omdat het tot 12 weken lang non-stop werkt. Ontpoppende vlooien krijgen gedurende deze tijd geen kans zich voort te planten.

## FARMACEUTISCHE VORM EN SAMENSTELLING

Spot-on oplossing. Bevat fluralaner.

## INDICATIES EN DOELDIER

- Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij katten.
- Dit diergeneesmiddel is een systemisch insecticide en acaricide met onmiddellijke en aanhoudende vlooien- (*Ctenocephalides felis*) en teken- (*Ixodes ricinus*) dodende werking gedurende 12 weken.
- Vlooien en teken moeten gehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Het effect treedt op binnen 12 uur na aanhechting van vlooien (*C. felis*) en binnen 48 uur na aanhechting van teken (*I. ricinus*).
- Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergie-dermatitis (VAD).

## Dosering

Eén pipet per kat. Kies de juiste pipet bij het gewicht van de kat.		
Bravecto® 112,5 mg (0,4 ml)	Bravecto® 250 mg (0,89 ml)	Bravecto® 500 mg (1,79 ml)
Katten van 1,2 - 2,8 kg	Katten >2,8 - 6,25 kg	Katten >6,25 - 12,5 kg

- Voor katten met een gewicht van meer dan 12,5 kg gebruikt u een combinatie van twee pipetten die het beste past bij het lichaamsgewicht.
- Dit product is voor topicaal gebruik en dient niet oraal toegediend te worden.
- Niet gebruiken bij kittens jonger dan 11 weken en/of katten lichter dan 1,2 kg omdat hierover geen informatie beschikbaar is.

## TOEDIENINGSINTERVAL

Het toedieningsinterval is 12 weken. Dien Bravecto® spot-on kat niet toe met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter toedieningsinterval niet is onderzocht.

## OVERDOSERING

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen na topicale toediening bij kittens met een leeftijd van 11-13 weken en een gewicht van 1,2-1,5 kg die op 3 momenten een overdosering toegediend kregen van tot 5 maal de maximaal aanbevolen dosering (93 mg, 279 mg en 465 mg fluralaner/kg lichaamsgewicht) met een korter interval dan aanbevolen (interval van 8 weken).

Orale opname van het product bij maximale aanbevolen dosering van 93 mg fluralaner/kg lichaamsgewicht werd goed verdragen door katten, afgezien van wat voorbijgaande speekselvorming, hoesten of braken direct na toediening.


## GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE EN FOK

De veiligheid van Bravecto® spot-on voor katten is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.


## CONTRA-INDICATIES EN BIJWERKINGEN

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Tijdens klinische studies werden bij 2,2% van de behandelde katten milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek waargenomen, zoals roodheid, jeuk of kaalheid. Overige symptomen die kort na toediening werden waargenomen zijn: apathie/trillen/gebrek aan eetlust (0,9% van de behandelde katten) of braken/speekselen (0,4% van de behandelde katten).


## TOEDIENINGSINSTRUCTIE BRAVECTO® SPOT-ON: DRAAI EN GEBRUIK!



Scheur het aluminium sachet open.



Houd de pipet met de dop omhoog. Knijp niet in de pipet.




Draai en gebruik: draai de knop 1x rond. Houd de pipet met de dop naar boven. De pipet is nu klaar voor gebruik.




Let op: de dop komt er niet af!



Het product dient bij katten tot 6,25 kg aangebracht te worden op één plek aan de schedelbasis (waar de kat met de tong niet bij kan).



Het product dient bij katten die zwaarder zijn dan 6,25 kg aangebracht te worden op twee plekken aan de schedelbasis (waar de kat met de tong niet bij kan).



Spreid de haren en druppel de hele inhoud van de pipet direct op de huid van de kat. Hoe beter u de inhoud van de pipet direct op de huid druppelt, hoe minder u het in de vacht ziet.

## WAARSCHUWINGEN / OVERIGE INFORMATIE

- Om blootgesteld te worden aan fluralaner moeten parasieten zich beginnen te voeden op de gastheer; het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.
- Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen Bravecto® spot-on voor katten en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.
- Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product en ter bescherming tegen uitdroging of vochtopname. De sachets moeten pas vlak voor gebruik geopend worden. Er zijn geen andere speciale voorzorgen voor de bewaring.
- Het actieve bestanddeel in het product is zeer lipofiel en hecht aan de huid; na morsen kan het product ook aan oppervlakken hechten. Als voorzorg wordt daarom aanbevolen geschikte handschoenen te dragen bij het hanteren of het toedienen van het product en aansluitend handen met zeep en water te wassen. In geval van morsen, bijvoorbeeld op tafel of vloeroppervlakken, de overmaat aan product verwijderen met een papieren tissue en het gebied schoonmaken met zeep.
- Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
- Voorkom contact met huid en/of ogen, inclusief hand-og contact. Dit product kan licht irriterend zijn voor de huid en/of ogen.
- Raak de toedieningsplek niet aan en voorkom dat kinderen deze aanraken totdat deze droog is.
- Laat de toedieningsplaats drogen voordat contact met leder, stof, kunststof en andere delicate oppervlakken wordt toegelaten. Dit helpt vlekken te voorkomen.
- Het product is zeer brandbaar. Houd het weg van warmte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

## VERPAKKING

Kartonnen doos met daarin een aluminiumfolie sachet dat 1 pipet bevat.

## KANALISATIESTATUS EN REGISTRATIENUMMERS

UDA. REG NL 116438-116440

ÉÉN KEER TOEDIENEN.  
TOT 12 WEKEN BESCHERMD  
TEGEN VLOOIEN EN TEKEN.

- Spot-on voor katten
- Bevat fluralaner
- Tot 12 weken systemisch werkzaam tegen vlooien en teken
- 12 weken therapietrouw
- Snelle werking
- UDA; dus exclusief voor de dierenarts



Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar.

MSD Animal Health, Postbus 50, 5830 AB Boxmeer