



Bovilis® Longworm

Beschermd de wei in!

Longwormschade is niet te genezen, maar wel te voorkomen. Door tweemaal te laten vaccineren met Bovilis® Longworm voordat uw jongvee de wei in gaat, zijn uw dieren bij normaal weidegebruik effectief beschermd.

Let op! Er moeten minimaal zes weken zitten tussen de eerste vaccinatie en het moment dat uw dieren naar buiten gaan.

Bestel tijdig het benodigde aantal doses vaccin bij uw dierenartspraktijk.



Vaccineren met Bovilis® Longworm betaalt zich dubbel en dwars terug

Bovilis® Longworm, bevat per dosis (25 ml): Minstens 1000 bestraalde levende *Dictyocaulus viviparus* larven (derde stadium, L3).
Doeldier: Rund. **Indicatie:** Actieve immunisatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken tegen parasitaire bronchitis, veroorzaakt door *Dictyocaulus viviparus*. **Bijwerking:** Een lichte respiratoire vaccinatie-reactie kan voorkomen. **Toediening en dosering:** Orale toediening van 1 dosis (25 ml). Tweevoudige vaccinatie van kalveren vanaf de leeftijd van 6 weken met telkens één dosis per dier, met een interval van 4 weken. **Wachtermijn:** 0 dagen. **Waarschuwing:** Na de tweede vaccinatie dient men 2 weken te wachten voordat de gevaccineerde dieren in een gecontamineerd milieu gebracht kunnen worden. REG NL 3219 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter.

www.rundvee-msd-animal-health.nl

 **MSD**
Animal Health
The Science of Healthier Animals®