

BRAVECTO® KAUWTABLET

Bravecto® (fluralaner; UDA) is een kauwtablet tegen vlooien en teken bij honden. De zeer potente acaricide en insecticide werking is systemisch en houdt tot 12 weken aan. Fluralaner is een werkzame stof die tot de ectoparasiticide-klasse van isoxazolines behoort. Bravecto® doodt vlooien en teken snel. Omdat Bravecto® de volwassen vlooien snel doodt, stopt de productie van levensvatbare eieren en wordt de levenscyclus van de vlo doorbroken.

Het duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden om een vlooieninfestatie onder controle te krijgen, mits de behandeling op tijd wordt herhaald. Helaas herhaalt 8 op de 10 eigenaren de behandeling niet op tijd. Bravecto® verkleint de kans dat een herbehandeling te laat wordt uitgevoerd omdat het 12 weken lang non-stop werkt. Ontpoppende vlooien krijgen gedurende deze tijd geen kans zich voort te planten.

Bravecto® kan worden gebruikt bij fok-, drachtige en lacterende honden en ook bij honden met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR 1 -/-), zoals Collies.

FARMACEUTISCHE VORM EN SAMENSTELLING

Kauwtablet met leversmaak voor oraal gebruik. Bevat Fluralaner.

INDICATIES EN DOELDIER

Voor de systemische behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden. Onmiddellijke en aanhoudende dodende werking tegen:

- *Ctenocephalides felis* (12 weken); te gebruiken als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooien-allergiedermatitis.
- *Ixodus ricinus*, *Dermacentor reticulatus* en *D. variabilis* (12 weken)
- *Rhipicephalus sanguineus* (8 weken)

Vlooien en teken moeten aangehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Binnen 8 uur na aanhechting van vlooien (*C. felis*) en binnen 12 uur na aanhechting van teken (*I. ricinus*) treedt het effect op.

TOEDIENING / DOSERINGDE JUISTE TABLET BIJ HET GEWICHT VAN DE HOND

Eén tablet per hond. Kies de juiste tablet bij het gewicht van de hond.

Bravecto® 112,5 mg	Bravecto® 250 mg	Bravecto® 500 mg	Bravecto 1000 mg	Bravecto® 1400 mg
Honden van 2-4,5 kg	Honden >4,5-10 kg	Honden >10-20 kg	Honden >20-40 kg	Honden >40-56 kg

- Voor honden met een gewicht van meer dan 56 kg dient een combinatie van twee tabletten te worden gebruikt die het beste past bij het lichaamsgewicht.
- Dien Bravecto® kauwtabletten toe tijdens of rond een maaltijd; dit vergroot de opname in het bloed.
- Niet gebruiken bij pups jonger dan 8 weken en/of honden lichter dan 2 kg omdat hierover geen informatie beschikbaar is.

TOEDIENINGSINTERVAL

Het toedieningsinterval voor vlooien is 12 weken. Het toedieningsinterval voor teken is afhankelijk van de tekensoort (8 tot 12 weken). Het product dient niet toegediend te worden met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter toedieningsinterval niet is onderzocht.

OVERDOSERING

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen na orale toediening bij pups met een leeftijd van 8-9 weken en een gewicht van 2,0-3,6 kg, die een overdosering toegediend kregen van 5 maal de aanbevolen maximale dosering tijdens 3 gelegenheden met een korter interval dan aanbevolen (interval van 8 weken).

GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE, FOK EN BIJ HONDEN MET MDR1-AFWIJKINGEN

De veiligheid van Bravecto® is bewezen bij fok-, drachtige en lacterende honden. Ook werd het diergeneesmiddel goed verdragen door Collies met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR 1 -/-) na eenmalige orale toediening van 3 maal de aanbevolen dosering (168 mg/kg lichaamsgewicht).

CONTRA-INDICATIES EN BIJWERKINGEN

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Tijdens klinische studies werden bij 1,6% van de behandelde honden milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan eetlust en kwijlen waargenomen.

WAARSCHUWINGEN / OVERIGE INFORMATIE

- Parasieten moeten zijn begonnen zich te voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner; het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.
- Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen Bravecto® kauwtabletten voor honden en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.
- Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product. Er zijn geen andere speciale voorzorgen voor de bewaring.
- Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
- Was de handen grondig met zeep en water direct na gebruik.

VERPAKKING

Kartonnen doos met daarin een aluminiumfolie blister die 1 kauwtablet bevat. De blister is geen doordrukblister, maar gemakkelijk met een schaar te openen.

KANALISATIESTATUS EN REGISTRATIENUMMERS

UDA. REG NL 113015 t/m REG NL 113019

EÉN KEER KAUWEN. TOT 12 WEKEN BESCHERMD TEGEN VLOOIEN EN TEKEN.

- Kauwtablet voor honden
- Nieuw molecuul
- Tot 12 weken systemisch werkzaam tegen vlooien en teken
- 12 weken therapietrouw
- Snelle werking
- UDA; dus exclusief voor de dierenarts
- Mag ook tijdens dracht, lactatie en fok
- Geschikt voor Collies en andere MDR 1 -/- rassen

