

# Rotkreupel succesvol bestrijden: Het 5 Punten Plan

## 1. AFVOEREN > vergroot de natuurlijke weerstand in de kudde

- Voorkom een continue besmettingsbron voor de kudde.
- Markeer elk kreupel dier en houd het aantal keer bij dat een dier kreupel is.
- Voer alle dieren af die 2x of vaker per jaar kreupel zijn geweest.
- Houd een strenge controle na de speenperiode.

## 2. VOORKOMEN > verminder de infectiedruk

- Scheid besmette en onbesmette dieren!
- Voorkom verspreiding rondom voer- en drinkbakken en zorg voor een goede afrastering.
- Laat de schapen regelmatig door een voetbad gaan.
- Gebruik bedrijfskleding en bedrijfseigen schoeisel.
- Bekap uw dieren niet onnodig.

## 3. BEHANDELEN > verminder de infectiedruk

- Overleg behandelingen altijd met uw dierenarts
- Registreer elke behandeling en doseer correct.
- Behandel zo snel mogelijk (binnen 7 dagen): voorkom dat de infectie chronisch wordt en dat het dier andere dieren besmet.
- Controleer het behandelde dier na 21 dagen en behandel zo nodig opnieuw.

## 4. QUARANTAINE > verminder de infectiedruk

- Controleer alle dieren die bij de kudde komen met de Klauw Scorekaart.
- Voer geen dieren met afwijkende klauwen aan.
- Ontsmet het vervoersmiddel na aanvoer van een nieuw dier.
- Voeg het dier pas bij de koppel na de quarantaineperiode.

## 5. VACCINEREN > verhoog de weerstand

- Geef uw weerstand een boost door de kudde te vaccineren.
- Overleg met uw dierenarts.
- Hierdoor komen er minder nieuw geïnfecteerde dieren in de kudde bij.
- Een goede mineralenvoorziening draagt bij aan een verhoogde weerstand.

