



Een goede spray
ontwikkelen was
makkelijker dan
de wereld op zijn
kop te zetten

Engemycine Spray

Nauwkeurig en betrouwbaar



MSD
Animal Health

Vier voordelen

Engemycine Spray (oxytetracycline) voor de behandeling van klauwproblemen en wonden bij rund, schaap en varken.

1. Uitstekende spraykwaliteit, als de spuitbus ondersteboven wordt gebruikt

- ✓ Door de innovatieve spraydop kan Engemycine Spray ook ondersteboven gebruikt worden
- ✓ Altijd een constante hoeveelheid werkzame stof
- ✓ Gemakkelijk bij het behandelen van klauwen en andere moeilijk te bereiken plekken

2. Een korte spraytijd

- ✓ Krachtige spray, weinig tijd nodig om de juiste hoeveelheid werkzame stof te leveren. Concurrerende producten hebben twee keer zo lang nodig om een vergelijkbare hoeveelheid af te geven

3. Betrouwbare sprayopbrengst

- ✓ Betrouwbaar spuitmechanisme dat niet verstopt raakt
- ✓ Optimale hoeveelheid werkzame stof, van begin tot eind
- ✓ Bus kan geheel opgebruikt worden
- ✓ De spraydop blijft stevig zitten bij gebruik van de spuitbus

4. Een nauwkeurige spuitmond waardoor de spray terecht komt waar dat moet

- ✓ Engemycine Spray geeft een mooi rond spuitpatroon en druipt niet na aanbrengen
- ✓ De spuitbus lekt niet, waardoor deze na gebruik nog steeds mooi schoon is
- ✓ De spray hecht uitstekend aan het huidoppervlak

Engemycine Spray en vijf andere sprays werden vergeleken op een aantal eigenschappen, zoals de volgende tabel laat zien.

	Diameter gesprayde oppervlak < 5 cm	Geen druipend sprayoppervlak	Bus blijft schoon na spuiten – rechtop	Bus blijft schoon na spuiten – ondersteboven	Geen lekkende spuitmond
Engemycine Spray	✓	✓	✓	✓	✓
Product A	X	✓	X	X	✓
Product B	X	X	X	X	✓
Product C	✓	✓	✓	✓	✓
Product D	✓	X	X	✓	✓
Product E	X	✓	X	X	X



Engemycine Spray, 3,84% (m/m), huidspray, suspensie voor rund, schaap en varken. REG NL 102670. **Kanalisisatie:** UDA. Werkzaam bestanddeel: Oxytetracyclinehydrochloride 5 g (3,84% (m/m)). **Indicaties:** Voor de behandeling van de volgende infecties veroorzaakt door, of geassocieerd met, organismen gevoelig voor oxytetracycline in runderen, schapen en varkens: Infectieuze klauwinfecties in het bijzonder veroorzaakt door: *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* en andere *Fusobacterium spp.*, en *Bacteroides spp.* Ondersteunende behandeling van oppervlakkige wondinfecties na operatie of lichamelijke verwondingen, bijvoorbeeld staartbijten bij varkens, schrammen en schaafwonden. **Dosering en wijze van toediening:** Goed schudden voor gebruik. De spuitbus kan zowel rechtop als ondersteboven gebruikt worden. Voor toepassing de te behandelen oppervlakte schoonmaken, waarna het product 1-2 seconden, op een afstand van 15-20 cm gesprayd kan worden, totdat het gebied een homogene kleur heeft. Herhaal de behandeling elke 12 uur gedurende 1 tot 3 dagen, afhankelijk van het genezingsresultaat. Om de beste resultaten in geval van laesies van de ondervoet te verkrijgen worden de volgende adviezen gegeven: Maak het gebied aan de onderpoot helemaal schoon waarbij vuil, exsudaat en necrotisch weefsel worden verwijderd. Zorg voor een droge ondergrond gedurende 12 uur na elke behandeling. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken voor de behandeling van spenen om te voorkomen dat het product in melk terecht komt. **Bijwerkingen:** Geen bekend. **Wachtermijn:** Rund: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Melk: 0 dagen. Schaap: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Melk: 0 dagen. Varken: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Blauwgekleurde delen van de varkenshuid dienen verwijderd te worden, voordat de rest van het dier wordt gebruikt voor humane consumptie. **Speciale waarschuwingen:** Alleen voor extern gebruik. Dieren dienen behandeld te worden in goed geventileerde ruimten. Niet in of dichtbij de ogen sprayen. Indien mogelijk dient het product gebruikt te worden op basis van gevoeligheidstesten. Er zijn geen nadelige effecten opgetreden gedurende het gebruik van dit product tijdens dracht en lactatie. Vanwege het risico op sensibilisatie en contact dermatitis dient de gebruiker huidcontact te vermijden. Draag geschikte ondoorlaatbare handschoenen tijdens toediening van het product. Vanwege het risico op oogirritatie dient contact met de ogen vermeden te worden. Bescherm ogen en gezicht. Niet in open vuur of op gloeiend materiaal sprayen. De bus niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Dampen niet inademen. Gebruik het product in de buitenlucht of in een goed geventileerde ruimte. Handen wassen na gebruik. Niet eten of roken tijdens de toepassing van het product. In geval van accidentele inname of contact met ogen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. **Voor meer informatie:** Zie bijsluiter.

Kijk voor de uitgebreide folder op www.rundvee-msd.nl