

5 ✓'s

VAN BIEST-MANAGEMENT

1. ✓ **veel** 2 tot 4 liter in de eerste gift
2. ✓ **lug** direct na de geboorte
3. ✓ **vaak** 5,5 tot 6 liter in eerste 24 uur
4. ✓ **vers** bewaar biest maximaal 7 dagen in de koelkast in een schone emmer en tot 1 jaar in de diepvries. Controleer de kwaliteit van de biest.
5. ✓ **Verrijkt door Rotavec Corona**

Biest van koeien die zijn gevaccineerd met Rotavec Corona bevat extra specifieke antistoffen tegen drie van de meest voorkomende ziekteverwekkers van kalverdiarree (rotavirus, coronavirus en *E. coli*).

Vraag uw dierenarts om advies

Rotavec™ Corona, bevat per dosis (2 ml): Geïnactiveerd bovien rotavirus, UK-Compton-stam, serotype G6 P5. ½ dosis vaccin stimuleert een virus neutraliserende antilichamen titer: $\geq 2^7$ /ml (cavia's). Geïnactiveerd bovien coronavirus, Madus-stam. 1/20 dosis vaccin stimuleert een ELISA-antilichamen titer: $\geq 10^4$ /ml (cavia's). *Escherichia coli* F5 (K99) aanhechtingsfactor. 1/20 dosis vaccin stimuleert een ELISA-antilichamen titer (OD450): $> 0,64$ (cavia's). **Doel-dier:** Rund. **Indicaties:** Actieve immunisatie van drachtige koeien en vaarzen om antilichamen aan te maken tegen het *E. coli*-aanhechtingsfactor F5 (K99) antigeen, het rotavirus en het coronavirus. Als kalveren gevoed worden met colostrum van gevaccineerde koeien tijdens de eerste twee tot vier levensweken, is aangetoond dat de antilichamen, die ernst van diarree veroorzaakt door *E. coli* F5 (K99), de incidentie van diarree veroorzaakt door rotavirus en de verspreiding van het rotavirus/coronavirus vermindert. **Bijwerkingen:** Incidenteel kan op de injectieplaats een lichte zwelling tot 1 cm worden waargenomen. Incidentele overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. **Toediening en dosering:** Intramusculaire injectie van een dosis van 2 ml. De aanbevolen plaats is de zijde van de nek. Een enkele injectie moet worden toegediend tijdens iedere dracht tussen de 12 en 3 weken voor afkalven. **Wachtermijn:** 0 dagen. **Waarschuwingen:** Bijzonder strenge voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen tegen contaminatie van het vaccin. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts. REG NL 9696 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter.