



NAFPENZAL® 3D
 Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
 DIERGENEESMIDDEL
 20 INJECTOREN

D R O O G Z E T T E R

NAFPENZAL® 3D

Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen

Samenstelling: Per polyethyleen injector van 3 gram:
 Dihydrostreptomycine (als dihydrostreptomycinesulfaat) 100 mg
 Nafciline (als nafcilinenatrium monohydraat) 100 mg
 Procainebenzylpenicilline 300 mg

Indicaties
 - Droogzetten van drachtige runderen en vetweiders.
 - Routematige toediening bij het droogzetten, ter behandeling van bestaande subklinische infecties veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken en gevoelige Gram-negatieve organismen zoals *Escherichia coli* en corynebacteriën (= *Truiperillo pyogenes*).
 - Behandeling van subklinische infecties met streptokokken, stafylokokken, gevoelige Gram-negatieve organismen zoals *E. coli* en corynebacteriën (= *T. pyogenes*) tijdens de eerste twee weken van de droogstand.

Contra-indicaties
 Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor (één van) de werkzame bestanddelen.

Bijwerkingen
 In zeer zeldzame gevallen kan een allergische reactie voorkomen.
 De frequentie van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
 - zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerkingen) gedurende de duur van één behandeling)
 - vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)
 - soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)
 - zelden (meer dan 1, maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)
 - zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).



Dosering en toediening
 Intramammair. Aan het begin van de droogstand 1 injector per kwartier.

Waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
 Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degenen die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
 Personen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines, andere β -lactamases of (één van) de hulpstoffen moeten het diergeneesmiddel niet hanteren. Benzylpenicilline, nafciline of dihydrostreptomycine kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inademing, innname of huidcontact. Overgevoeligheid voor callosporines kan leiden tot kruis-gevoeligheid voor penicillines en vice versa. Allergische reacties op deze stoffen kunnen incidenteel ernstig zijn. Hanter dit diergeneesmiddel met grote voorzichtigheid om blootstelling te vermijden door alle voorzorgsmaatregelen te nemen.
 Zwangere vrouwen mogen dit diergeneesmiddel niet toedienen.
 Wanneer er na blootstelling symptomen, zoals slijm, ontstaan dient u een arts te raadplegen en deze de bijlouter te tonen. Zwelling van het gezicht, lippen of ogen of moeite bij het ademen zijn ernstigere symptomen en vereisen dringend medische zorg.

Gebruik tijdens dracht en/of lactatie:
 Het product is geïndiceerd voor gebruik tijdens de dracht.
 Niet gebruiken tijdens de lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
 Bij gelijktijdig gebruik van β -lactam antibiotica en aminoglycosiden treedt synergisme op.
 Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Compatibiliteit:
 Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Bewaring
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 Bewaren beheden 25 °C. Beschermen tegen bevroering.

Verwijdering
 Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.



817131841084842

164912 R1

D R O O G Z E T T E R

NAFPENZAL® 3D

Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
 DIERGENEESMIDDEL
 20 INJECTOREN



D R O O G Z E T T E R


NAFPENZAL® 3D

Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
 DIERGENEESMIDDEL
 20 INJECTOREN



PSAO20237 03 R1
 235x116x102mm
 C M Y K

D R O O G Z E T T E R



Toepassingsmogelijkheden Duo Dip
 Batch/EXP:

Wachtermijnen
 (Orgaan)lees: 15 dagen
 Melk:
 - 48 dagen na toediening bij een droogstand korter dan 46 dagen.
 - 2 dagen na afkalven bij een droogstand gelijk aan of langer dan 46 dagen.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
 REG NL 9705 **UDD**
 9 februari 2016

houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
 Intervet Nederland B.V.
 Postbus 50
 5830 AB Boxmeer
 Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
 Intervet International B.V.
 Wim de Körverstraat 35
 5831 AN Boxmeer
 Nederland

imprint area
 Varnish Free