

Nobilis®

AE+PD



LEVEND VACCIN TEGEN TRILZIEKTE EN POKKENDIFTERIE
BIJ KIPPEN
DIERGENEESMIDDEL UDA



SAMENSTELLING

Lyofilisaat met bijbehorende suspenseervloeistof voor suspensie voor injectie.

Per dosis van 0,01 ml:

Werkzame bestanddelen:

Levend aviaire encephalomyelitis virus, stam Calnek 1143:	≥ 10 ^{2,5} EID ₅₀ *
Levend aviaire pokken virus, stam Gibbs:	≥ 10 ^{2,8} EID ₅₀

*EID₅₀ = embryo infective dose 50%

DOELDIER

Kip (fok- en vermeerderingsdieren).

INDICATIES

Actieve immunisatie van fok- en vermeerderingskippen op de leeftijd van 8-16 weken (maar niet binnen 4 weken vóór of tijdens de legperiode) tegen kippenpokken en -difterie en bescherming van hun nakomelingen tegen aviaire trilziekte.

CONTRA-INDICATIES

Niet vaccineren binnen 4 weken vóór of tijdens de legperiode.

DOSERING EN TOEDIENING

Vaccinatieschema:

Enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier op de leeftijd van 8-16 weken.

Immuniteitsduur:

Na vaccinatie met dit middel volgens voorschrift is met betrekking tot kippenpokken en -difterie een immuniteit van 2 maanden aangetoond.

De duur van de immuniteit tegen trilziekte bij nakomelingen is niet vastgesteld.

Intracutane toediening van een dosis per dier via wing-web methode.

WACHTTIJD

Nul dagen.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN

- Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel.
- Gedurende minstens een maand na vaccinatie contact tussen gevaccineerde dieren en niet-gevaccineerde dieren vermijden.

- Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Lyofilisaat: bewaren in een koelkast bij 2-8 °C. Beschermen tegen licht.

Suspendeervloeistof: bewaren beneden 25 °C, indien het onafhankelijk van het vaccin bewaard wordt.

Gesuspendeerd vaccin: binnen 2 uur gebruiken.

Niet gebruiken na de uiterste vervaldatum vermeld op het etiket.

VERWIJDERING

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel in overeenstemming met de nationale vereisten.

VERPAKKING

Doos met flacon à 500 of 1000 doses en flacon suspendeervloeistof.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 3973 UDA

Augustus 2011

025989 R2

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Een product van:
Intervet International B.V.

 **MSD**
Animal Health