

Nobilis®

E. COLI Inac



GEÏNACTIVEERD VACCIN TEGEN COLIBACILLOSE BIJ KIPPEN

DIERGEHEESMIDDEL

UDA



SAMENSTELLING

Emulsie voor injectie.

Per dosis van 0,5 ml:

Werkzame bestanddelen:

F11-antigeen suspensie met 100 µg F11 (E. coli fimbriaal antigeen) 68,3 mg

FT-antigeen suspensie met 100 µg FT (E. coli flagellair toxine antigeen) 68,3 mg

Adjuvans:

Vloeibare paraffine 214,42 mg

Hulpstof:

Formaline (conserveermiddel) 0,675 mg

DOELDIER

Kip (vleeskuiken-ouderdieren).

INDICATIE

Partiële passieve immuniteit van vleeskuikens gedurende de eerste 7 levensweken, door vaccinatie van de vleeskuiken-ouderdieren, als hulpmiddel tegen postnatale colibacillose (luchtzakinfecties en sepsis), veroorzaakt door fimbriaal F11-antigeen en flagellair FT toxine bevattende *E. coli*.

CONTRA-INDICATIES

Geen.

DOSERING EN TOEDIENING

Intramusculaire of subcutane injectie van 0,5 ml vaccin (1 dosis) in vleeskuiken-ouderdieren.

Vaccinatieschema:

Tweevoudige vaccinatie met telkens 1 dosis per dier met een interval van ten minste 6 weken.

Eerste vaccinatie op een leeftijd van 6-12 weken, hervaccinatie op een leeftijd van 14-18 weken.

Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) komen.

Goed schudden voor gebruik. Gebruik steriele vaccinatieapparatuur.

WACHTTIJD

(Orgaan)vlees: 35 dagen.

Eieren: nul dagen.

BIJWERKINGEN

Lokale weefselreacties van granulomateuze aard en in een aantal gevallen necrose of abscessen komen voor. Vijf weken na vaccinatie zijn de lokale reacties aanzienlijk afgenomen.

In vergelijking met een enkele dosis reactie zijn de effecten na toediening van een dubbele dosis vergelijkbaar maar ernstiger.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN

- Vaccineer alleen gezonde kippen.

- Voor de gebruiker:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelf-injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

- Voor de arts:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

- Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin op dezelfde dag kan worden toegediend, maar niet gemengd, met andere geïnactiveerde vaccins van hetzelfde bedrijf tegen aviaire infectieuze bronchitis, aviaire infectieuze bursitis, aviaire tenosynovitis en pseudovogelpest.

Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

- Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C.

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de flacon.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 10 uur.

VERWIJDERING

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

VERPAKKING

Doos met glazen of PET flacon à 250 (500 doses) of 500 ml (1000 doses).

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

OVERIG

De E. coli antigenen zijn opgenomen in een water-in-olie emulsie voor een verhoogde en langdurige productie van antilichamen tegen E. coli fimbriaal antigeen en E. coli flagellair toxine antigeen.

REG NL 8266

UDA

Juli 2011

028877 R2 6.11

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50, 5830 AB Boxmeer

Een product van:

Intervet International B.V.

 **MSD**
Animal Health