

# Nobilis®

## ILT



LEVEND VACCIN TEGEN INFECTIEUZE  
LARYNGOTRACHEÏTIS BIJ KIPPEN



DIERGEENESMIDDEL UDA

### SAMENSTELLING

Lyofilisaat voor suspensie voor oculaire toediening.

Per dosis:

*Werkzaam bestanddeel:*

Levend, geattenuëerd aviaire infectieuze laryngotracheïtis virus, stam Serva:  
≥ 10<sup>2,5</sup> EID<sub>50</sub>\*

\* EID<sub>50</sub> = Embryo Infective Dose 50%

### DOELDIER

Niet-eierleggende kip.

### INDICATIE

Actieve immunisatie vanaf de leeftijd van 4 weken tegen aviaire infectieuze laryngotracheïtis.

### CONTRA-INDICATIES

Geen.

### DOSERING EN TOEDIENING

#### Vaccinatieschema:

Tweevoudige vaccinatie met telkens 1 dosis per dier, waarvan de eerste vaccinatie op de leeftijd van 4-6 weken en de tweede vaccinatie op de leeftijd van 14-16 weken, via oculaire toediening.

*Oculair, via druppelmethode:*

Los het vaccin op in de bijbehorende hoeveelheid suspenseervloeistof (Solvens Oculo/Nasal). Een druppel per dier toedienen met bijgeleverde druppelaar.

Immuniteitsduur:

Na vaccinatie volgens voorschrift is een immuniteitsduur van 6 maanden onderbouwd.

### WACHTTIJD

Nul dagen.

### BIJWERKINGEN

Een geringe en voorbijgaande vaccinatiereactie (conjunctivitis en respiratoire verschijnselen) kan voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

### WAARSCHUWINGEN

Contact met leggende kippen moet vermeden worden.

Er is geen informatie beschikbaar over de verenigbaarheid van dit vaccin met enig ander vaccin.

Daarom is de veiligheid en effectiviteit van dit product, wanneer gebruikt met enig ander vaccin (hetzij op dezelfde dag of elk ander moment) niet aangetoond.

Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel.

In verband met contactdermatitis en irritatie van huid dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

#### **BEWARING**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8 °C.

Beschermen tegen licht.

Beschermen tegen bevriezing.

Gesuspendeerd vaccin: direct gebruiken.

#### **VERWIJDERING**

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, in overeenstemming met de nationale vereisten.

#### **VERPAKKING**

Doos met flacons à 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 of 10.000 doses.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 2653 UDA

September 2011

114894 R1

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50

5830 AB Boxmeer

Een product van:

Intervet International B.V.



**MSD**

Animal Health