

Nobilis®

PARAMYXO P201



GEÏNACTIVEERD HOMOLOOG VACCIN TEGEN PIGEON PARAMYXOVIRUS-1 (PPMV-1)

INFECTIES BIJ DUIVEN

DIERGEENEESMIDDEL UDD



SAMENSTELLING

Emulsie voor injectie.

Per dosis van 0,25 ml:

Werkzaam bestanddeel:

Geïnactiveerd duiven paramyxovirus type 1 (PPMV-1) antigenen, stam P201: geïnduceerd $\geq 2^{6,8}$ HI* en $\leq 2^{10,2}$ HI units in kippen.

* = Haemagglutinatie inhibitie antilichaamfiter

Hulpstof:

Vloeibare paraffine: 138 mg

DOELDIER

Duif.

INDICATIES

Actieve immunisatie van duiven ter vermindering van klinische symptomen veroorzaakt door een infectie met virulente PPMV-1.

Het is aangetoond dat de vaccinatie de virusuitscheiding na challenge duidelijk vermindert.

Aanvang van immuniteit:

Vier weken na de primaire vaccinatie.

Immuniteitsduur:

Een immuniteitsduur van 1 jaar is aangetoond.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken in zieke dieren.

DOSERING EN TOEDIENING

0,25 ml per dosis.

Aan elk dier 0,25 ml vaccin toedienen middels subcutane injectie in het lagere achterste gedeelte van de nek.

Herhalingsvaccinatie:

Jaarlijkse hervaccinatie wordt aanbevolen.

Vogels kunnen gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 5 weken.

Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) komen.

Goed schudden voor gebruik.

Gebruik steriele spuit en naalden.

WACHTTIJD

Nul dagen.

BIJWERKINGEN

Er zijn geen klinische symptomen waargenomen na vaccinatie.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN

Voor de gebruiker:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid minimaal is, en zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft.

Consulteer opnieuw een arts, als de pijn tot meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundige chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn een vroege incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke delen van de vinger of pezen aangetast zijn.

Vaccinatie binnen 4 weken voor het begin van het broedseizoen wordt ontraden. Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid van dit product gedurende de voortplantingsperiode.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Niet mengen met andere vaccins/immunologische producten.

BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8 °C.

Beschermen tegen bevriezing.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken.

VERWIJDERING

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

VERPAKKING

Doos met flacon(s) à 20 (80 doses), 50 (200 doses) of 250 (1000 doses) ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 10030

UDD

Juli 2011

110479 R2

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Een product van:
Intervet International B.V.

