

Nobilis®

REO Inac



GEÏNACTIEVEERD VACCIN TEGEN REO VIRUS INFECTIES BIJ KIPPEN

DIERGEENESMIDDEL UDA



SAMENSTELLING

Emulsie voor injectie.

Per dosis van 0,5 ml:

Werkzaam bestanddeel:

Geïnactiverde aviaire reovirusen, stammen 1733 en 2408: ≥ 27.4 ELISA* eenheden inducerend.

Adjuvans:

Licht vloeibare paraffine 215 mg

* ELISA = Enzyme linked immunosorbent assay

DOELDIER

Kip.

INDICATIES

Passieve immuniteit van kippenkuikens tegen aandoeningen veroorzaakt door aviaire reovirus (serotype S1133) via actieve re-immunisatie van de moederdieren.

Immunitetsduur:

Na vaccinatie met dit middel volgens voorschrift is bij de nakomelingen een immuniteit in de eerste levensweken aannemelijk gemaakt.

CONTRA-INDICATIES

Geen.

DOSERING EN TOEDIENING

Vaccinatieschema:

Basisvaccinatie:

Enkelvoudige vaccinatie met Nobilis Reo 1133, REG NL 1792, op de leeftijd van 6-10 weken.

Herhalingsvaccinatie:

Enkelvoudige vaccinatie met een dosis Nobilis Reo Inac per dier op de leeftijd van 16-20 weken.

of:

Basisvaccinatie:

Enkelvoudige vaccinatie met Nobilis Reo 1133, REG NL 1792, op de leeftijd van 6 weken.

Herhalingsvaccinatie:

Tweevoudige vaccinatie met een dosis Nobilis Reo Inac per dier op de leeftijd van 10 en 16-20 weken, niet korter dan 4 weken voor het begin van de legperiode.

Toediening van 1 dosis van 0,5 ml via intramusculaire of subcutane injectie.

Tweevoudige hervaccinatie induceert hogere en uniforme antistofniveaus dan enkelvoudige hervaccinatie met dit middel.

Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) komen.

Voor en af en toe tijdens het gebruik goed schudden.

WACHTTIJD

Nul dagen.

BIJWERKINGEN

Een lokale vaccinatieractie kan voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN

Voor de gebruiker:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid minimaal is. Zorg ervoor dat u de bijsluiting bij u heeft.

Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn. Kan tijdens de legperiode worden gebruikt.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik met enig ander diergeenestmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeenestmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder Bijwerkingen.

Niet vermengen met enig ander vaccin of immunologisch middel.

BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C.

Beschermen tegen bevriezing.

Beschermen tegen licht.

VERWIJDERING

Ongebruikte diergeenestmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

VERPAKKING

Doos met flacon(s) à 250 ml (500 doses) of 500 ml (1000 doses).

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 2371 UDA

Juli 2011

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50

5830 AB Boxmeer

Een product van:

Intervet International B.V.

116384 R2 7.11

