

108639 R2

# Nobilis® RT+IBmulti+G+ND



DIERGEENESMIDDEL UDA

GEÏNACTIVEERD VACCIN TEGEN RHINOTRACHEÏTIS,  
INFECTIEUZE BRONCHITIS, INFECTIEUZE BURSTITIS  
EN PSEUDOVOGELPEST BIJ KIPPEN



## SAMENSTELLING

Emulsie voor injectie.

Per dosis van 0,5 ml:

Werkzame bestanddelen:

ART stam But1#8544	≥9,5 log <sub>2</sub> ELISA* eenheden inducerend*
IBV stam M41 (Massachusetts):	≥5,5 log <sub>2</sub> VN** eenheden inducerend*
IBV stam 249g (D274/D207):	≥4,0 log <sub>2</sub> VN** eenheden inducerend*
IBDV stam D78:	≥14,5 log <sub>2</sub> VN** eenheden inducerend*
NDV stam Clone 30:	≥4,0 log <sub>2</sub> HI*** eenheden per 1/50 dosis inducerend*
	of
	≥50 PD <sub>50</sub> **** eenheden bevattend

Adjuvans:

Vloeibare paraffine 215 mg

- \* serologische respons in kippen
- \* ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay
- \*\* VN = virusneutraliserende
- \*\*\* HI = haemagglutinatieremmende
- \*\*\*\* PD<sub>50</sub> = protective doses 50%

## DOELDIER

Kip (toekomstige fok- en vermeerderingskippen).

## INDICATIES

Actieve immunisatie van fok- en vermeerderingskippen ter:

- preventie van respiratoire verschijnselen en reductie van een productiedaling en eischaal afwijkingen gerelateerd aan het aviaire rhinotracheïtis virus;
- reductie van infectie en het voorkomen van een productiedaling veroorzaakt door het Massachusetts serotype van het infectieuze bronchitis virus;
- reductie van een productiedaling en eischaal afwijkingen veroorzaakt door het D274/D207 serotype van het infectieuze bronchitis virus;
- passieve immunisatie van de nakomelingen van gevaccineerde dieren tegen het infectieuze bursitis virus ten minste de eerste 4 levensweken;
- reductie van infectie veroorzaakt door het pseudovogelpest virus.

Voor infectieuze bronchitis, pseudovogelpest en het aviaire rhinotracheïtis virus:

Aanvang van immuniteit:

Vier weken na vaccinatie.

Immuniteitsduur:

Eén legperiode.

## CONTRA-INDICATIES

Geen.

## DOSERING EN TOEDIENING

Aan elk dier 0,5 ml vaccin intramusculair toedienen in de dij- of borstspier.

Nobilis RT+IBmulti+G+ND wordt toegediend aan dieren van ongeveer 14-20 weken oud maar niet later dan 4 weken voor het verwachte begin van de legperiode.

Indien levende vaccins gebruikt zijn om dieren te primen tegen rhinotracheïtis, infectieuze bronchitis, infectieuze bursitis en

pseudovogelpest dient Nobilis RT+IBmulti+G+ND minstens 4 weken na de toediening van de levende vaccins gegeven te worden.

Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) komen.

Voor en af en toe tijdens het gebruik goed schudden.

Gebruik schone en steriele vaccinatieapparatuur zonder rubberen delen, aangezien de hulpstof bepaalde types rubber aan kan tasten.

#### **WACHTTIJD**

Nul dagen.

#### **BIJWERKINGEN**

Een milde zwelling kan gedurende 2 weken op de injectieplaats waargenomen worden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

#### **WAARSCHUWINGEN**

Vaccineer alleen gezonde dieren.

Niet gebruiken tijdens de leg of binnen 4 weken voor het begin van de legperiode.

Voor de gebruiker:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid minimaal is. Zorg ervoor dat u de bijsluiters bij u heeft.

Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik met een ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel.

Na een dubbele dosering zijn er geen andere verschijnselen waargenomen dan na enkelvoudige dosering.

#### **BEWARING**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C.

Beschermen tegen bevriezing.

Beschermen tegen licht.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: binnen 3 uur gebruiken.

#### **VERWIJDERING**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

#### **VERPAKKING**

Doos met flacon à 500 (250 ml) of 1000 (500 ml) doses.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

#### **OVERIG**

Nobilis RT+IBmulti+G+ND is een geïnactiveerd viraal vaccin tegen infectieuze bronchitis (Massachusetts en D274/D207), Newcastle disease, aviaire rhinotracheïtis en infectieuze bursitis (Gumboro).

REG NL 9707 UDA

Juli 2011

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxtmeer  
Een product van:  
Intervet International B.V.

108639 R2



PSC020S10\_01\_1 120x160mm Black