

# Nobilis®

## RT+IBmulti+ND+EDS

086328 R1



DIERGEHEESMIDDEL

UDA



GEÏNACTIEVEERD VACCIN TEGEN RHINOTRACHEÏTIS, INFECTIEUZE BRONCHITIS,  
PSEUDOVOGELPEST EN EGG DROP SYNDROME IN KIPPEN

### SAMENSTELLING

Emulsie voor injectie.

Per dosis van 0,5 ml:

Werkzame bestanddelen:

Geïnactieveerde virale antigenen van:

IBV stam M41	≥5,5 log <sub>2</sub> VN** eenheden inducerend*
IBV stam 249g	≥4,0 log <sub>2</sub> VN** eenheden inducerend*
ART stam But1#85.44	≥9,5 log <sub>2</sub> ELISA* eenheden inducerend*
EDS'76 stam BC1.4	≥6,5 log <sub>2</sub> HI**** eenheden inducerend*
NDV stam Clone 30	≥4,0 log <sub>2</sub> HI**** eenheden per 1/50 van een dosis*
	≥50 PD <sub>50</sub> **** eenheden bevattend

Adjuvans:

Vloeibare paraffine 21,5 mg

- \* serologische respons in kippen
- \* ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay
- \*\* VN = virusneutraliserende
- \*\*\* HI = haemagglutinerremmende
- \*\*\*\* PD<sub>50</sub> = protective doses 50%

### DOELDIER

Kip (lok, vermeerderings- en legkippen).

### INDICATIES

Actieve immunisatie van fok-, vermeerderings- en legkippen ter:

- reductie van infectie en het voorkomen van een productiedaling veroorzaakt door serotype Massachusetts van het Infectieuze Bronchitis virus;
- reductie van een productiedaling en ejschaal afwijkingen veroorzaakt door het serotype D274/D207 van het Infectieuze Bronchitis virus;
- reductie van infectie veroorzaakt door het Newcastle Disease virus;
- preventie van respiratoire verschijnselen en reductie van een productiedaling en ejschaal afwijkingen als gevolg van een infectie met het aviaire Rhinotracheïtis virus (aviair pneumovirus);
- reductie van een productiedaling en ejschaal afwijkingen als gevolg van een infectie met het EDS'76 virus.

### Aanvang van immuniteit:

Vier weken na vaccinatie.

Immuniteitsduur:

Eén legperiode.

### CONTRA-INDICATIES

Geen.

### DOSERING EN TOEDIENING

Aan elk dier 0,5 ml vaccin intramusculair toedienen in de dij- of borstspier.

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS wordt toegediend aan dieren van 14-20 weken oud maar niet later dan 4 weken voor het verwachte begin van de legperiode.

In het geval dat levende vaccins gebruikt zijn om dieren voor te enten tegen Infectieuze Bronchitis, Rhinotracheïtis en Newcastle Disease, dient Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS tenminste 4 weken na toediening van de levende vaccins gegeven te worden.

Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) komen.

Voor en af en toe tijdens het gebruik goed schudden.

Gebruik schone en steriele vaccinatieapparatuur zonder rubberen delen, aangezien de hulpstof bepaalde types rubber aan kan tasten.

### WACHTTIJD

Nul dagen.

## BIJWERKINGEN

Een licht voorbijgaande zwelling kan gedurende 2 weken op de injectieplaats waargenomen worden. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## WAARSCHUWINGEN

Vaccineer alleen gezonde dieren.

Niet gebruiken tijdens de leg of binnen 4 weken voor het begin van de legperiode.

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel.

Na een dubbele dosering zijn er geen andere verschijnselen waargenomen dan na enkelvoudige dosering.

Voor de gebruiker:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid minimaal is. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft.

Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:

Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn een vroege incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

## BEWARING

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast bij 2-8 °C.

Beschermen tegen bevroering.

Beschermen tegen licht.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de flacon.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: binnen 3 uur gebruiken.

## VERWIJDERING

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## VERPAKKING

Doos met flacon à 500 (250 ml) of 1000 (500 ml) doses.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

## OVERIG

Het vaccin stimuleert de actieve immuniteit tegen Infectieuze Bronchitis virus (Massachusetts en D274/D207), Newcastle Disease virus, Aviaire Rhinotracheïtis virus en tegen Egg Drop Syndrome '76 virus.

Het vaccin bevat een olie adjuvans.

REG NL 10222

UDA

Juli 2011

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50

5830 AB Boxmeer

Een product van:

Intervet International B.V.

086328 R1



**MSD**  
Animal Health