

# Panacur®

## Suspensie 2,5%, (25 mg/ml) orale suspensie voor schapen

DIERGEENESMIDDEL

**Samenstelling:** Per ml:

Werkzaam bestanddeel:	
Fenbendazol	25 mg
Hulpstoffen:	
Natriummethylparahydroxybenzoaat (E219)	2.000 mg
Natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217)	0,216 mg
Benzylalcohol (E1519)	4,835 mg

**Indicaties:** Voor de behandeling van maagdarmparasieten en longworminfecties bij het schaap.

**Maagdarmparasieten:** *Haemonchus* spp., *Trichuris* spp., *Ostertagia* spp., *Bunostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Strongyloides* spp., *Oesophagostomum* spp., *Chabertia* spp. en *Gaigeria pachyscelis*.

**Longworm:** *Dictyocaulus filaria*. **Contra-indicatie:** Geen. **Bijwerkingen:** Geen bekend. Indien u ernstige

bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. **Dosering en toediening:** Orale toediening. Eenmalig 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht (5 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht). Schudden voor gebruik. **Wachtermijn:** (Orgaan)vlies: 28 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. **Waarschuwingen:** Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeenemiddel bestemd is: De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van

resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

- herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,  
- onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeenemiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing). Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de tests duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend.

Resistentie tegen benzimidazolen bij schapen wordt in een aantal landen, ook binnen de EU, gerapporteerd. Derhalve dient het gebruik van dit diergeenemiddel gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van nematoden/helminthica species en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden.

**Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:** In verband met mogelijke

overgevoelheidsreacties en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

**Gebruik tijdens dracht of lactatie:** In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid in het gebruik van het product te worden betracht. **Onverenigbaarheden:** Niet vermengen met enig ander diergeenemiddel. **Bewaring:** Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen bevriezing. **Verwijdering:** Ongebruikte diergeenemiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

11 maart 2014



Batch:  
EXP:



5 4 12734 000174

 **MSD**  
Animal Health

146423 R3