



132314 R1

Panacur® Boli



1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet GesmbH
Siemensstrasse 105
A-1210 Wenen
Oostenrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Panacur Boli

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per bolus:

Werkzaam bestanddeel:

Fenbendazol 250 mg

4. INDICATIES

Behandeling van infecties met volwassen en onvolwassen vormen, alsmede eieren van de volgende maagdarmwormen en longwormen: *Haemonchus contortus*, *Trichuris ovis*, *Ostertagia* spp., *Bunostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum* spp., *Dictyocaulus filaria* en *Chabertia ovina*.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Schaap.



8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Eenmalige toediening van 1 bolus per 50 kg lichaamsgewicht (5 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht).

Houd het dier met zijn kop in voorwaartse, uitgestrekte houding en zorg ervoor dat de hals recht blijft. Plaats de pillenschieter met bolus recht in de bek en duw deze rustig over de rug van de tong. Vanaf het moment dat het dier het uiteinde begint in te slikken, gaat het inbrengen zeer gemakkelijk. Duw de pillenschieter niet te diep in de keel. De bolus kan toegediend worden door op de knop te duwen. Trek de pillenschieter rustig terug. Gebruik geen geweld bij het toedienen van de bolus. Verzeker u ervan dat ieder dier de bolus daadwerkelijk doorslikt.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTIJD

(Orgaan)vlees: 21 dagen.

Melk: 7 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Bij *Haemonchus contortus* is resistentie tegen benzimidazolen in Nederland aangetoond. Bij de behandeling van schapen dient hiermee rekening te worden gehouden.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Maart 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met 5 kunststof/aluminium blisters à 10 boli. Het product kan geleverd worden met een pillenschieter.

REG NL 8650

16. KANALISATIE

URA

