



BIJSLUITER

Planate™

87,5 µg/ml oplossing voor injectie voor varkens

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:
Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Vet Pharma Friesoythe GmbH
Sedelsbergerstrasse 2-4
D-26169 Friesoythe
Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Planate, 87,5 µg/ml oplossing voor injectie voor varkens

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Cloprostenol (overeenkomend met cloprostenolnatrium) 87,5 µg

Hulpstof:

Chloorcresol 1 mg

4. INDICATIES

Partusinductie, binnen de twee dagen die het einde van de dracht voorafgaan.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Eénmalig 2 ml product (175 microgram cloprostenol) per dier.

Toedieningswijze: intramusculair.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTERMIJN

Orgaan(vlees): 1 dag.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht en vorst.

Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

- Te vroege inductie of te vroeg jongen kan leiden tot niet-levensvatbare biggen. Een toename van het aantal niet-levensvatbare biggen is mogelijk indien het product meer dan 2 dagen voor het einde van de gemiddelde verwachte dracht wordt toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:

Bij de toepassing dient direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Indien de huid in aanraking komt met dit product, dient men de huid onmiddellijk goed met water af te spoelen.

Zwangere vrouwen en CARA-patiënten lopen extra risico wanneer ze in aanraking komen met het product.

Dracht:

- Niet toedienen aan drachtige dieren indien een abortus niet gewenst is.

Onverenigbaarheden:

- Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

13. SPECIALE

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

8 november 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Flacon(s) à 10 of 20 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

REG NL 5294

16. KANALISATIE

UDA



MSD
Animal Health

