BIJSLUITER 163244 R1

Porcilis®

PARVO,

SUSPENSIE VOOR INJECTIE VOOR VARKENS

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Porcilis Parvo, suspensie voor injectie voor varkens

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per dosis van 2 ml:
Werkzaam bestanddeel:
Geïnactiveerd porcine parvovirus, stam 014: ≥ 552 EU*

*ELISA Unit, bepaald met antigene massa ELISA.

Adjuvans:
Dl-α-tocopheryl acetaat: 150 mg

Hulpstoffen:
Formaldehyde: 1,08 mg

4. INDICATIE

Voor de actieve immunisatie van gelten en zeugen ter bescherming van embryo's of foetussen tegen aandoeningen veroorzaakt door porcine parvovirus.

Immuniteitsduur:
Na vaccinatie volgens voorschrift zijn embryo's respectievelijk foetussen gedurende een dracht beschermd tegen de klinische symptomen als gevolg van infecties met porcine parvovirus.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen bekend.

6. BIJWERKINGEN

Een lokale of systemische vaccinatiereactie kan voorkomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Eén dosis van 2 ml vaccin per dier, via intramusculaire injectie.

Vaccinatieschema:
Enkelvoudige vaccinatie met 1 dosis per dier. Gelten 8 tot 2 weken voor de eerste dekking, zeugen 2 weken voor de dekking.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

- Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur komen (15 °C - 25 °C).
- Vaccineren tot 2 weken voor het insemineren.

10. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in een koelkast bij 2 °C - 8 °C. Beschermen tegen licht.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15 °C - 25 °C) laten komen.

Dracht en lactatie:
Vaccineren tot 2 weken voor het insemineren.
Kan tijdens de lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder Bijwerkingen.

Onverenigbaarheden:
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

10 februari 2016

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met flacon(s) à 20, 50 of 100 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 7387

KANALISATIE
UDD

MSD
Animal Health

PSC020528 03 R1 120x320mm Black