



1 liter
4 mg altrenogest
per ml



Batch:

EXP:

Imprint area
zone



Regumate® Pig

4 mg/ml orale oplossing voor varkens

Samenstelling

Aluminium flacon à 1 liter met een losse, doorzichtige plastic doseerbeker.

Werkzaam bestanddeel:

Altrenogest (allyltrenbolon) 4 mg/ml

Farmaceutische vorm

Heldere, lichtgele, geurloze oplossing.

Indicaties

Oestrussynchronisatie en -sturing in cyclische gelten.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren met metritis.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet op dit etiket worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toediening

5 ml (20 mg altrenogest) per dier, gedurende 18 dagen.

Verwijder de schroefdop en de afsluiter en meet de klinische dosis van 5 ml af met de losse doseerbeker, giet de dosis over het voer en sluit na gebruik de flacon met de afsluiter en schroefdop.

Wachtijd

Vlees en slachtafval: 9 dagen.

Waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

- Zwangere vrouwen en vermoedelijk zwangere vrouwen dienen het diergeneesmiddel niet te gebruiken. Vruchtbare vrouwen dienen uiterst voorzichtig met het diergeneesmiddel om te gaan.

- Het diergeneesmiddel dient niet gehanteerd te worden door personen waarvan bekend is of waarbij aanwezig zijn dat ze progesteron-afhankelijke tumoren of thrombo-embolische afwijkingen hebben.

- Direct contact met de huid vermijden. Persoonbeschermende kleding (handschoenen en overalls) dient gedragen te worden bij toepassing van het diergeneesmiddel. Poreuze handschoenen kunnen het diergeneesmiddel doorlaten. De opname door de huid kan zelfs groter zijn als het gebied bedekt is met afsluitend materiaal zoals latex of rubber handschoenen. Diergeneesmiddel dat op de huid komt dient direct afgewassen te worden met zeep en water.

- Was de handen na behandeling en voor de maaltijd.

- In geval van contact met de ogen wassen met overvloedig water gedurende 15 minuten. Raadpleeg een arts.

- Effecten van overmatige blootstelling: herhaalde opname kan leiden tot verstoring van de menstruele cyclus, baarmoeder- of buikkrampen, toegenomen of afgenomen menstruatie, verlengde zwangerschap of hoofdpijn.

Overige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de invloed op het milieu:

Bij verspreiding van mest van behandelde dieren dient de minimale afstand tot het oppervlakte water, zoals vastgelegd in nationale of lokale regelgeving, strikt gevolgd te worden, aangezien de mest altrenogest kan bevatten welke een ongunstige uitwerking op het watermilieu kan hebben.

Gebruik tijdens dracht of lactatie:

Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Belangrijke onverenigbaarheden:

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

Bewaring en houdbaarheid

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

Na openen gebruiken binnen 90 dagen.

Verwijdering

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de tekst voor het laatst is herzien

20 februari 2020

Overige informatie

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

REG NL 5745 UDA

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor de vrijgifte:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk

Aanbreekdatum:



361326 R1