

Scalibor[®]

**Protectorband 0,76 g medicineerde
halsband voor kleine en middelgrote
honden**

**Protectorband 1,0 g medicineerde
halsband voor grote honden**

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel
brengen:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

of

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Scalibor Protectorband 0,76 g medicineerde
halsband voor kleine en middelgrote honden
Scalibor Protectorband 1,0 g medicineerde halsband
voor grote honden
Deltamethrin

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDE(E)N

Per witte halsband van 48 cm:

| | |
|------------------------------|---------|
| <u>Werkzaam bestanddeel:</u> | |
| Deltamethrin | 0,760 g |
| <u>Hulpstof:</u> | |
| Titaniumdioxide (E171) | 0,285 g |

Per witte halsband van 65 cm:

| | |
|------------------------------|---------|
| <u>Werkzaam bestanddeel:</u> | |
| Deltamethrin | 1,000 g |
| <u>Hulpstof:</u> | |
| Titaniumdioxide (E171) | 0,375 g |

4. INDICATIE(S)

Bestrijding van infestaties met teken (*Ixodes ricinus*,
Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden.
Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome
zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 tot
6 maanden.
Anti-feeding effect op volwassen muggen (*Culex
pipiens pipiens*) gedurende 6 maanden.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:

- Pups jonger dan 7 weken.
- Honden met huidlaesies.
- Dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroiden.
- Katten.



NIET GEBRUIKEN BIJ KATTEN.

6. BIJWERKINGEN

In zeldzame gevallen zijn lokale huidreacties
(bijvoorbeeld jeuk/krabben, erytheem/uitslag,
haaruitval) in de hals of van de huid in het algemeen
waargenomen die mogelijk op een lokale of algemene
overgevoelighedsreactie wijzen.

In zeer zeldzame gevallen is afwijkend gedrag (bv.
lethargie of hyperactiviteit), vaak geassocieerd met
huidirritatie, waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen zijn gastro-intestinale
symptomen zoals braken, diarree en hypersalivatie
waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische problemen
zoals ataxie en spiertremoren waargenomen.
De symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur na
het afdoen van de halsband.

De halsband verwijderen als een van deze symptomen
zich voordoet. Behandeling dient symptomatisch te zijn
aangezien er geen specifiek antidotum bekend is.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt
gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren
vertonen bijwerkingen gedurende de duur van één
behandeling)
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de
100 behandelde dieren)
- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de
1.000 behandelde dieren)
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de
10.000 behandelde dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde
dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige
~~reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden~~
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in
kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Hond

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK


De 48 cm lange halsband is voor gebruik bij kleine en
middelgrote honden.

De 65 cm lange halsband is voor gebruik bij grote
honden.

Voor bevestiging om de hals. Eén halsband per hond.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Verwijder de halsband uit het dichtgesealde sachet
en breng deze losjes rond de hals van de hond aan.
Houd 2 platte vingers ruimte tussen de band en de hals
van de hond. Haal het einde door de gesp en knip de
resterende band af op 5 cm van de gesp.



10. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
De halsband in het dichtgesealde sachet dient bewaard
te worden in de kartonnen buitenverpakking.
Bewaren beneden 25 °C.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum
vermeld op de buitenverpakking en het sachet.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Aangezien de halsband na één week de volledige
werkzaamheid bereikt, dient de halsband bij voorkeur
één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld
worden aan infestatie aangebracht te worden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich
vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder
ongunstige omstandigheden kan de transmissie van
infectieuze ziekten door teken of zandvliegen daarom
niet volledig worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de
symptomen verdwenen zijn.

Het effect van wassen op de duur van de werkzaamheid
van het diergeneesmiddel is niet onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de
persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren
toedient:

Na het omdoen van de halsband de handen goed
wassen met koud water en zeep.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor
bestanddelen van de halsband moeten contact
met het diergeneesmiddel en het behandelde
dier vermijden. Zoek medische hulp in geval van
overgevoelighedsreacties.

Voorkom dat kinderen, met name kinderen jonger dan
2 jaar, de band aanraken, ermee spelen of in hun mond
stoppen. Men moet ervoor zorgen dat jonge kinderen
geen intensief contact hebben, zoals slapen, met
honden die een band dragen.
Bewaar het dichtgesealde sachet met de halsband in
de kartonnen buitenverpakking tot gebruik.

Overige voorzorgsmaatregelen:

Hoewel de werking van de halsband niet vermindert
als deze af en toe in contact komt met water dient
de halsband altijd verwijderd te worden voordat de
hond gaat zwemmen of wordt gewassen, omdat de
werkzame stof schadelijk is voor vissen en andere
waterorganismen. Men moet voorkomen dat de hond
gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen dat de
hond de halsband draagt.

Dracht:

Kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Lactatie:

Kan tijdens de lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere
vormen van interactie:

Niet gebruiken in combinatie met andere
ectoparasitociden die organofosfaten bevatten.

Overdosering (symptomen, procedures in
noodgevallen, antidota):

In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband
opeet, kunnen de volgende symptomen optreden:
ongecoördineerde bewegingen, trillen, kwijlen, braken,
stijfheid van de achterhand.



Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur.
Indien nodig kan symptomatisch behandeld worden met diazepam.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu. Het diergeneesmiddel of de verpakking dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

1 februari 2021.

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Scalibor Protectorband

0,76 g gemedicineerde halsband voor kleine en middelgrote honden: REG NL 9979

Scalibor Protectorband

1,0 g gemedicineerde halsband voor grote honden: REG NL 9980

KANALISATIE

VRIJ