



BIJSLUITER

138216 R1

# T 61<sup>®</sup>

oplossing voor injectie

## 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1a  
Unterschleissheim  
Duitsland

## 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

T 61, oplossing voor injectie  
Embutramide, Mebezoniumjodide, Tetracaïnehydrochloride.

## 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Embutramide	200 mg
Mebezoniumjodide	50 mg
Tetracaïnehydrochloride	5 mg

## 4. INDICATIE

Euthanasie.

## 5. CONTRA-INDICATIES

Niet in de pleurale holte injecteren.  
Alleen toepassen bij dieren die buiten bewustzijn verkeren.  
Niet toepassen bij drachtige dieren.

## 6. BIJWERKINGEN

In zeer zeldzame gevallen zijn convulsies of excitatie gerapporteerd. Hartstilstand kan vertraagd optreden.  
Opmerking: Het gebruik van T61 resulteert in histopathologische bevindingen zoals laesies van het endotheel, pulmonaire congestie, pulmonair oedeem en hemolyse.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## 7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Grote (landbouw)huisdieren, hond, kat, nerts, overige dieren, zoals vogels en kleine laboratoriumdieren.

## 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Toedieningsweg:

Intraveneus, intrapulmonaal, intracardiaal.

Uitsluitend voor toepassing door dierenartsen.

T61 dient bij geanaestheerde dieren te worden toegepast. Dit om te voorkomen dat als T61 niet correct wordt toegediend of niet goed wordt geabsorbeerd, dieren bij bewustzijn een verstikking beleven.

Bij gebruik van T61 uiterste voorzichtigheid betrachten.

Intraveneuze toediening dient zodanig plaats te vinden dat de hele dosering intraveneus wordt toegediend.

Gebruik van een intraveneuze katheter wordt aangeraden.

Niet gebruiken bij drachtige dieren.

### Grote dieren

Intraveneus:

4 - 6 ml product per 50 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 16-24 mg embutramide, 4-6 mg mebezoniumjodide en 0,4-0,6 mg tetracaïnehydrochloride per kg lichaamsgewicht

Ononderbroken, maar niet te snel inspuiten (om excitatie door tetracaïne te vermijden).

### Hond:

Intraveneus:

0,3 ml product per kg lichaamsgewicht overeenkomend met 60 mg embutramide, 15 mg mebezoniumjodide en 1,5 mg tetracaïnehydrochloride per kg lichaamsgewicht.

Ononderbroken, maar niet te snel inspuiten (om excitatie door tetracaïne te vermijden). Het laatste 1/3 deel kan vlugger worden toegediend.

tot 10 kg lichaamsgewicht:

7 tot 10 ml product intrapulmonaal, overeenkomend met 1400-2000 mg embutramide, 350-500 mg mebezoniumjodide en 35-50 mg tetracaïnehydrochloride.

zwaarder dan 10 kg lichaamsgewicht:

een eerste dosis van 10 ml product intrapulmonaal (overeenkomend met 2000 mg embutramide, 500 mg mebezoniumjodide en 50 mg tetracaïnehydrochloride) gevolgd door een supplement van 3 tot 10 ml product intracardiaal of intrapulmonaal (overeenkomend met 600-2000 mg embutramide, 150-500 mg mebezoniumjodide en 15-50 mg tetracaïnehydrochloride).

Injectietechniek: de gunstigste injectieplaats ligt bij de rechtstaande of op de buik liggende hond in het bovenste derde van de thorax, dicht achter de achterrand van het schouderblad: een scherpe naald, met een lengte afhankelijk van de grootte van het dier, moet schuin naar voor worden gestoken in de richting van het ellepijphoofd aan de overkant.

Kat:

Intracardiaal of intrapulmonaal:

Enkele dagen oude kittens : 1 ml product, overeenkomend met 200 mg embutramide, 50 mg mebezoniumjodide en 5 mg tetracaïnehydrochloride.  
tot 6 maanden: 3 ml product, overeenkomend met 600 mg embutramide, 150 mg mebezoniumjodide en 15 mg tetracaïnehydrochloride.  
ouder dan 6 maanden: 5 ml product, overeenkomend met 1000 mg embutramide, 250 mg mebezoniumjodide en 25 mg tetracaïnehydrochloride.  
zwaarder dan 5 kg: 10 ml product, overeenkomend met 2000 mg embutramide, 500 mg mebezoniumjodide en 50 mg tetracaïnehydrochloride.

Injectietechniek: bij voorkeur inspuiten bij op de buik liggende katten. De inspuiting geschiedt 2-3 cm onder de wervelkolom in het midden van de thorax: een scherpe naald met een lengte afhankelijk van de grootte van het dier, schuin naar voor insteken in de richting van het ellepijphoofd aan de overkant.

Nerts:

Intracardiaal of intrapulmonaal:

0,5 tot 1 ml product per dier, overeenkomend met 100-200 mg embutramide, 25-50 mg mebezoniumjodide en 2,5-5 mg tetracaïnehydrochloride.

Overige dieren:

Intracardiaal of intrapulmonaal:

0,5 tot 2 ml product per dier, overeenkomend met 100-400 mg embutramide, 25-100 mg mebezoniumjodide en 2,5-10 mg tetracaïnehydrochloride, naargelang de grootte van het dier.

## 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

## 10. WACHTTERMIJN

Met dit diergeneesmiddel gedode dieren mogen niet geconsumeerd worden door mens of dier.

## 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 28 dagen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

## 12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Uitsluitend voor toepassing door dierenartsen.

T61 alleen toepassen bij bewusteloze (geanaestheseerde) dieren. Dit om de mogelijkheid te voorkomen dat onder ongunstige absorptiecondities, dieren bij bewustzijn een verstikking beleven.

Bij gebruik van T61 uiterste voorzichtigheid betrachten.

Intraveneuze toediening dient zodanig plaats te vinden dat de hele dosering intraveneus wordt toegediend.

Gebruik van een intraveneuze katheter wordt aangeraden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Dit diergeneesmiddel is zeer giftig! Op een veilige, afgesloten plaats bewaren.

Direct contact met T61 vermijden.

Trek verontreinigde kleding meteen uit.

In geval van direct contact van T61 met een open wond, slijmvlies of de huid direct het getroffen gebied wassen met water en zeep en goed naspoelen.

Indien T61 in de ogen komt, onmiddellijk de geopende ogen gedurende een aantal minuten spoelen met schoon stromend water.

In geval van een prikaccident onmiddellijk het aangeprikte gebied uitdrukken en de wond wassen met ruim water en zeep. Na intramusculaire injectie: afbinden van betreffende extremitet, uitdrukken aangeprikt gebied.

Bij accidentele inname of een prikaccident direct medisch advies inwinnen en de bijsluiter of het etiket aan de arts tonen.

Antidota;

In geval van opname van T61 in de circulatie door absorptie uit wonden of na injectie:

Cardiopulmonaire reanimatie, toediening van atropine en neostigmine, gevolgd door beschermende levertherapie met N-acetylcysteïne en indien nodig hemodialyse.

Dracht:

Niet gebruiken tijdens de dracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

## 13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## 14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

5 februari 2015

## 15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met flacon(s) à 50 ml.

REG NL 5356

KANALISATIE

UDD

